

Aus der Königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Breslau.

Direktor: Geheimrat Professor Dr. Küstner.

Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1908/09 bis 1910/11.

Inaugural-Dissertation

der

Hohen Medizinischen Fakultät der Königl. Universität
Breslau

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der

Medizin und Chirurgie

vorgelegt von

Max Bleisch,

prakt. Arzt in Naumburg a. Qu.



Breslau 1911.

Druck der Breslauer Genossenschafts-Buchdruckerei, E. G. m. b. H.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der
Universität Breslau.

Referent: Professor Dr. Küstner.

Die Wichtigkeit der Beckenform für den Ausgang der Geburt bei Mutter und Kind bringt es mit sich, daß den Geburten bei engem Becken immer größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und so ist mir die Aufgabe geworden, die Arbeiten von Heinsius, Kretschmer, Kapischke und Kohn über die Geburten beim engen Becken in der Breslauer Universitäts-Frauenklinik aus den Jahren 1894 bis 1908 fortzusetzen, wie ja eine ganze Anzahl von Kliniken großen Wert darauf legen, eine möglichst große Menge von Geburten bei engem Becken zu sammeln und ihre Resultate mit denen anderer Kliniken zu vergleichen. Gilt es doch, nicht nur den Wert der alten anerkannten Operationsmethoden zu prüfen, sondern auch möglichst objektiv festzustellen, was die neuen Methoden in bezug auf den Ausgang für Mutter und Kind zu leisten vermögen und inwieweit sie danach den alten vorzuziehen sind. Als Zweck der Arbeit möchte ich also betrachten:

1. die Feststellung des Ausganges der Geburten bei engem Becken für Mutter und Kind und der Resultate der einzelnen Operationsmethoden;
2. die Frage zu beantworten, ob durch neuere Operationsmethoden, speziell durch die *sectio cervicalis*, bessere Resultate für Mutter und Kind erzielt werden können.

In den oben erwähnten Arbeiten aus der Breslauer Frauenklinik sind zusammengestellt worden: von Heinsius aus den Jahren 1894/95 bis 1896/97 139 Fälle, von Kretschmer aus den Jahren 1897/98 bis 1899/1900 115 Fälle, von Kapischke aus den Jahren 1900/01 bis 1902/03 403 Fälle und von Kohn aus den Jahren 1903/04 bis 1907/08 322 Fälle. Mir stehen aus den Jahren 1908/09 bis 1910/11 211 sowohl dem klinischen als dem poliklinischen Material entnommene Fälle von Geburten bei engem Becken zur Verfügung.

Als obere Grenze für das enge Becken habe ich, wie es Heinsius und Kohn gemacht haben und wie ich es auch bei Yamasaki gefunden habe, eine solche von einer *conjugata diagonalis* = 11,5 cm resp. einer *conjugata vera* = 9,5 cm genommen. Diese Maße, wie die übrigen angegebenen Beckenmaße sind teils direkt den Geburtsjournalen, teils dem „Enges Beckenbuch“ entnommen. Wo die c. v. nicht direkt mit dem Küstnerschen Verazirkel gemessen wurde oder nicht schon durch Schätzung aus der c. d. im Geburtsbericht vermerkt wurde, habe ich sie durch Abzug von 2 cm von der c. d. bestimmt. Ich habe die Fälle unberücksichtigt gelassen — im Gegensatz zu Kohn, Heinsius, Kretschmer und Kapischke —, bei denen keinerlei Maßangabe zu finden war, da ich fürchtete, daß der Objektivität des entbindenden Arztes in der Beurteilung des Beckens doch mitunter Fehler unterlaufen sind, wenn er keinerlei Maßangaben in dem Geburtsbericht macht. Ebenso halte ich den Geburtsverlauf allein für nicht genügend, um auf ein enges Becken zu schließen und dies für die Berechnung zu verwerten. Dagegen habe ich die wenigen Fälle, bei denen aus anderen Maßen, als die c. d. oder c. v., ein einigermaßen sicherer Schluß auf eine Beckenverengung gezogen werden kann, aufgeführt und auch bei den Endresultaten verwertet, ebenso die Fälle, bei denen „Promontorium leicht erreicht“ oder dergleichen vermerkt ist.

Um kurz die Ätiologie der engen Becken zu streifen, führe ich folgende Angaben an, die ich in 122 Fällen in den Geburtsgeschichten gefunden habe:

Rhachitis in 85 Fällen = 69,6% (Kohn in 45,21%).

Chlorose und Tbc.-belastung in 7 Fällen = 5,8%.

Exsudative Diathese in 3 Fällen = 2,4%.

Allgemeine Schwächlichkeit und Kleinheit in 25 Fällen = 20,5%.

Unfall als Kind (Kyphoskoliosen, Tbc.?) in 2 Fällen = 1,6%.

Von den 211 Fällen bei engem Becken sind 57 Erstgebärende, 50 Zweitgebärende und 104 Mehrgebärende. Das Alter der Gebärenden zeigt keinen abnormen Fall, die größte Mehrzahl befindet sich zwischen 20 und 30 Jahren.

Die folgende Tabelle gibt Aufschluß über die verschiedenen Kindslagen:

Kindslage	I. p.	II. p.	Mehrp.
I. Schädellage	35	33	54
II. Schädellage	17	13	29
Stirnlage	2	0	4
Gesichtslage	1	0	0
Beckenendlage	0	1	8
Querlage	1	3	8

2 Geburten sind Zwillingsgeburten, der eine Fall eine Mehrgebärende, die Kinder lagen in I. und II. Schädellage, der andere Fall eine Erstgebärende mit I. Schädellage und II. Steißlage. Sie sind in obiger Tabelle nicht einbezogen.

Es beträgt demnach die Zahl der Schädellagen beim engen Becken 86,6%. Ganz ähnliche Zahlen haben Litzmann und Metzler, nämlich 84,6% resp. 87,1%. Die regelwidrigen Lagen machen 13,4% aus, und zwar nehmen sie, wie stets beobachtet, bei Mehrgebärenden einen bedeutend größeren Prozentsatz ein. Während sie bei Erstgebärenden 7,1% der Gesamtzahl betragen (Metzler 8,3%), sind es bei Zweit- und Mehrgebärenden 15,1%. Am stärksten sind die Beckenendlagen und Querlagen bei Mehrgebärenden beteiligt und zwar in einer Höhe von 13,1%.

Im Folgenden lasse ich ein Verzeichnis der von mir zusammengestellten 211 Geburten bei engem Becken folgen. Sie sind zusammengestellt wie in den 3 letzten Arbeiten über die Geburten bei engem Becken, und zwar nach Graden von 1 zu 1 cm, d. h. 1. c. v. 9,5—8,5, 2. 8,4—7,5, 3. 7,4 bis 6,5, 4. die Fälle ohne Angabe der c. v. oder c. d. Außerdem werden bei jedem Grade der Beckenverengung die Erst- und Mehrgebärenden gesondert behandelt und diese wieder nach dem Entbindungsmodus zusammengestellt.

Hierfür habe ich gleich Metzler die Glöcknerschen folgenden Grundsätze benutzt:

Es rechnen unter:

1. Spontangeburt: alle Fälle, die in Schädellage verlaufen, Die äußeren Handgriffe (Cristeller, Hofmeier) oder Versuche, Komplikationen zu beseitigen (Umwandlung pathologischer Lagen in normale, Reposition von vorgefallener Nabelschnur oder vorgefallenen Extremitäten) oder Walchersche Hängelage rechne ich mit hierher.
2. Typische Zange: alle Geburten, bei denen die Zange am vorangehenden Kopfe nach den Maximen für diese Operation angelegt war.
3. Hohe Zange: die Fälle, die durch Zangenextraktion am beweglichen, über dem Beckeneingang stehenden Kopfe beendet wurden.
4. Wendung: alle sowohl aus Kopflage, als aus Querlage auf den Fuß gewendeten und extrahierten Fälle, auch bei Perforation des nachfolgenden Kopfes. Die Perforation des nachfolgenden Kopfes rechne ich gleich Metzler nicht zur Perforation, weil dadurch das Resultat der Wendungen ungerechtfertigterweise ganz erheblich verbessert würde.
5. Perforation: alle durch Perforation am vorangehenden Kopf beendeten Geburten und ein Fall von Rhachiotomie.
6. Extraktion: alle Fälle von primären Beckenendlagen, ob sie sofort extrahiert worden sind oder ob nur Arm-lösung usw. gemacht worden ist.

Die verschiedenen Arten des Kaiserschnittes führe ich in der Tabelle gesondert an, in der späteren genaueren Besprechung trenne ich nur klassischen vom cervikalen Kaiserschnitt.

Künstliche Frühgeburt und Hebosteotomie fand ich je nur durch einen Fall vertreten. Ich behandelte sie daher beide bei der hohen Zange, die zur Beendigung der Geburt in beiden Fällen vorgenommen wurde.

Erklärungen zu dem Verzeichnis der Fälle.

Pol. = der Fall ist dem poliklinischen Material entnommen.

Kl. = der Fall stammt aus der geburtshilflichen Station der Klinik

Gyn. = der Fall entstammt der gynäkologischen Station.

sp. i. = distantia spinarum iliacarum.

cr. i. = distantia cristarum iliacarum.

c. d. = conjugata diagonalis.

c. v. = conjugata vera.

B. E. = Beckeneingang nicht unter.

B. M. = Beckenmitte nicht unter.

B. A. = Beckenausgang nicht unter.

K. = Knabe.

M. = Mädchen.

Die erste Zahl hinter K. oder M. lebt oder tot = Gewicht.

L. = Länge.

K. U. = Kopfumfang.

Sch. U. = Schulterumfang.

Gr. D. = Gerader Durchmesser des Kopfes.

Gr. schr. = Großer schräger Durchmesser des Kopfes.

Kl. schr. = Kleiner schräger Durchmesser des Kopfes.

Gr. qu. = Großer querer Durchmesser des Kopfes.

Kl. qu. = Kleiner querer Durchmesser des Kopfes.

p. oder part. = partus.

p. p. = post partum.

a. p. = ante partum.

Die Beckenmaße bedeuten von links nach rechts gelesen: Distantia spinarum, distantia cristarum, conjugata externa, conjugata diagonalis, wenn ihre nähere Bezeichnung nicht besonders vor der betreffenden Zahl angegeben ist.

Gc. = Gonokokken.

Tbc. = Tuberkulose.

Vera 9,5—8,5.

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
1. 09/10. Pol. 452	17	I. p.	25 18 c. d. 11	—	I. Schl.	—	34	Me- konium- abgang	—	M. lebt, 3030, L. 51, K. U. 36, Sch. U. 37, Gr. D. 11 ³ / ₄ , Gr. schr. 14, Kl. schr. 9 ¹ / ₂ , Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 7,5	—	Mutter: klein. Kind: starke Kopf- geschwulst. Spontangeburt.
2. 08/09. Kl. 141	23	I. p. Rhachitis	23 15 c. v. 8 ³ / ₄ B. M. 10 B. A. 8	—	II. Schl.	vor- zeitig	12	Urin: 3,75 % Album., Zylinder	6. Tag 38,5 8. Tag 40,0. Status sub- febrilis bis zur Ent- lassung. Mastitis dextra, Bronchitis	M. lebt, 2450, L. 48, K. U. 34,5, Sch. U. 32, Gr. D. 11 ³ / ₄ , Gr. schr. 13,5, Kl. schr. 9, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7 ¹ / ₄	—	Spontangeburt. Mutter 126 cm groß, schwach ausgeprägt, Kyphoskoliose, Hängebauch. Kind leicht asphyktisch
3. 08/09. Kl. 255	28	I. p. Als Kind ge- fallen, vor 2 Jahren Appendicitis	24 19 c. v. 9 B. M. 10 B. A. 9	—	I. Schl.	—	12 ¹ / ₄	—	5. Tag 37,4	M. lebt, 3080, L. 51, K. U. 34,5, Sch. U. 34, Gr. D. 11,5, Gr. schr. 13 ³ / ₄ , Kl. schr. 9,5, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 8	Damm- naht	Mutter: leichte Kyphoskoliose. Kind: blau asphyk- tisch, wiederbelebt. Dammriß II. Gr. Spontangeburt
4. 08/09. Kl. 269	20	I. p. Rhachitis, mit 2 Jahren laufen gelernt	25 18 c. v. 8 ³ / ₄ —9 B. M. 11 B. A. 10,5	—	I. Schl.	—	24	Urin: Alb. stark f. Neigung zu hinterer Scheidel- bein- einstellung.	o. B.	K. lebt, 3260, L. 52, K. U. 35, Sch. U. 36, Gr. D. 11,5, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10 ¹ / ₄	—	Mutter: klein, schlechte Zähne, rachitisch, Thorax. Spontangeburt

I. Erstgebärende. Spontangeburt.

6. 08/09. Kl. 345	37	I. p. Als Kind Wolfsrachen	26 27 16 10 c. d. 11 c. v. 8,5	platt	I. Schl.	—	20 $\frac{3}{4}$	Mazentert. Kind. Keine Herztöne	5. u. 8. Tag subfebrile Temperat. v. 5. Tage ab stinkende Lochien	Gr. qu. 8. Kl. qu. 7 M. tot, 2350, L. 51	—	Mutter: schwäch- lich. Kind: Kopfknochen pergamentartig. Spontangeburt
7. 08/09. Kl. 457	25	I. p.	24 26 18,5 11 c. v. 9,5 B. M. 10 B. A. 9	—	I. Schl.	vor- zeitig	14 $\frac{1}{2}$	—	o. B.	K. lebt, 3400, L. 53, K. U. 36, Sch. U. 37, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 9,5, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 8	—	Spontangeburt. Kind: asphyktisch, starke Kopf- geschwulst, links- seitige Fazialis- parese
8. 08/09. Kl. 496	27	I. p.	c. d. 11,5	—	II. Schl.	—	37 $\frac{1}{4}$	Me- konium- abgang	o. B.	K. lebt, 3490, L. 52, K. U. 38, Sch. U. 39, Gr. D. 13 $\frac{1}{4}$, Gr. schr. 15, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 8	—	Mutter: klein Kind: leicht asphyk- tisch; am 2. Tage Exitus des Kindes. Sektion: kleinere Blutungen in den inneren Organen. Spontangeburt
9. 08/09. Kl. 563	19	I. p. Rhachitis	23 26 16,5 11 $\frac{1}{4}$ c. v. 9,5	—	I. Schl.	—	90 $\frac{1}{2}$	—	5. Tag 37,4, geringes Infiltrat d. rechten Mamma	K. lebt, 2960, L. 50, K. U. 36,5, Sch. U. 36, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 9,5, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	—	Spontangeburt. Mutter: klein
10. 08/09. Kl. 849	28	I. p.	25 27 16 11 c. v. 9 $\frac{1}{4}$ B. E. 10 B. M. 11 B. A. 8	—	I. Schl.	—	29 $\frac{1}{2}$	vordere Mutter- mundslippe ödematös, zw. Kopf u. Symphyse ein- geklümmert	o. B.	K. lebt, 3140, L. 50, K. U. 36, Sch. U. 37, Gr. D. 11,5, Gr. schr. 14, Kl. schr. 9,5, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 8 $\frac{1}{4}$	—	Spontangeburt. Mutter: sehr klein, sehr starke Kypho- skoliose, starker Hängebauch. Kind: harte Kopfknochen

grazil.
Kind: kleiner Kopf.

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
11. 08/09. Kl. 891	19	I. p. Mit 13 Jahren skrophulöse Augen- entzündung	24 25 18 c. d. 11	platt	I. Schl.	—	29 $\frac{3}{4}$	—	o. B.	K. lebt, 3200, L. 50,5, K. U. 37,5, Sch. U. 36, Gr. D. 12,5, Gr. schr. 14,5, Kl. schr. 10, Gr. qu. 10, Kl. qu. 8	Walcher- sche Hänge- lage	Mutter: klein, rhachitischer Rosen- kranz. Spontangeburt
12. 08/09. Kl. 290	20	I. p.	24,5 26,5 18,5 10,5 c. v. 9—9,5	—	I. Schl.	—	38	neben dem etwas n. rechts ab- gewich. Kopf eine Hand	o. B.	K. lebt, 3300, L. 52, K. U. 37, Sch. U. 38, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9 $\frac{3}{4}$, Kl. qu. 9,5	—	Mutter: klein. Spontangeburt
13. 09/10. Kl. 539	20	I. p.	24 25 19,5 10 c. v. 9 B. E. 12 B. M. 12 B. A. 9	—	I. Schl.	—	14 $\frac{1}{2}$	—	bis 4. Tag status sub- febrilis. Riechende Lochien	M. lebt, 2650, L. 49,5, K. U. 35,5, Sch. U. 34,5, Gr. D. 11,5, Gr. schr. 13, Kl. schr. 9 $\frac{1}{4}$, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 8 $\frac{1}{4}$	—	Spontangeburt. Mutter: rhachitisch. Rosenkranz. Kind: leicht asphyk- tisch
14. 09/10. Kl. 684	21	I. p. Rhachitis. Mit 14 Jahren laufen gelernt	24 25 17 9 c. v. 8 $\frac{3}{4}$ B. E. 11,5 B. M. 10,5 B. A. 10	Pro- mon- torium tief- stehend	I. Schl.	—	27 $\frac{3}{4}$	—	sub- febrile Temp. bis 37,7. Riechende Lochien	K. lebt, 2720, L. 51,5, K. U. 36, Sch. U. 37, Gr. D. 11, Gr. schr. 14, Kl. schr. 9, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5	—	Mutter: klein, Verdickung der Rippenknorpel, vorspringende Tubera frontalia. Spontangeburt
15. 09/10. Kl. 695	23	I. p. Geschwister hatten Rhachitis	25 26,5 20 c. d. 11,5	—	I. Schl.	vor- zeitig	85	—	o. B.	K. lebt, 2810, L. 51, K. U. 37, Sch. U. 36, Gr. D. 12, G. schr. 13,5, Kl. schr. 10.	Damm- naht	Dammriß I. Gr. Spontangeburt

Kl. 699		18,5 c. d. 10,5	—	—	—	—	—	K. U. 35, Sch. U. 35, Gr. D. 12, Gr. schr. 13, Kl. schr. 9, Gr. qu. 8½, Kl. qu. 7	Spontangeburt
17. 10/11. Kl. 1073	23	25,5 20 c. d. 10½	—	—	—	—	—	M. lebt, 2540, L. 45, K. U. 33, Sch. U. 33, Gr. D. 11, Gr. schr. 12,5, Kl. schr. 9,5, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7	Spontangeburt
18. 10/11. Kl. 1107	25	26 18,5 c. v. 9 B. E. 11 B. M. 11 B. A. 7	—	—	—	—	—	M. lebt, 3000, L. 50, K. U. 34,5, Sch. U. 35, Gr. D. 11,5, Gr. schr. 13,5, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7	Spontangeburt

Operative Entbindungen.

19. 08/09. Kl. 227	25	24,5 21,5 c. d. 11,5	—	—	72	Zange. Kon- traktions- ring	o. B.	K. lebt, 2940, L. 51, K. U. 33,5, Sch. U. 31,5, Gr. D. 11, Gr. schr. 13, Kl. schr. 9,5, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5	Mutter: rechts- seitiger Scheidenriß. Atonia uteri. Kind: asphyktisch, gr. Kopfgeschwulst
20. 08/09. Kl. 868	33	23 18 c. d. 11	—	—	89½	Hy- dramnion, 3 Kon- traktions- ring	Mutter post partum gestorben	K. lebt, 3500, L. 56, K. U. 38, Sch. U. 40, Gr. D. 12½, Gr. schr. 15, Kl. schr. 11, Gr. qu. 10, Kl. qu. 9	Mutter: Riß b. ins linke Parametrium. Atonia uteri. Damuriß II. Gr. ½ Std. p. p. Puls klein, nicht zählbar, Bläs-e. 1 Std. p. p. Kollaps, 3 Std. p. p. Exitus. Sektion: Harnblasengrund hämorrhagisch, keine Uterusruptur. Arteria uterina nicht verletzt. Starke Strumabildung. Todesursache unklar. Kind: am rechten Scheitelbein Druck- marke. Am 3. T. Exitus

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
21. 10/11. Kl. 623	20	I. p.	21, 25,5 17,5 10,5 c. v. 9,1 B. C. 11 B. M. 8,5 B. A. 9,5	—	II. Schl.	—	14½	tiefes Querstand	2. Tag 38,4 3. u. 6. Tag 38,1 7. Tag 38,9	K. lebt, 3500, L. 52, K. U. 36,5, Sch. U. 38, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 9, Gr. qu. 8,5, Kl. qu. 7,5	Episio- tomie. Zange in Narkose. Episio- tomienahrt	Kind: leicht asphyktisch. am 5. Tage Blennorrhoe, (c. +
Hohe Zange.												
22. 09/10. Kl. 262	22	I. p. Rhachitis	c. d. 10½	flaches, schmal. Becken	II. Schl.	vor- zeitig	36½	Febris intra- partum; 38,6, Puls 74. Eklampsie, Kontrak- tionsring. Herztöne 70—80	5. Tag: Lochio- metra. Temp. 38,1	K. tot, 3360, L. 54	Mutter- munds- inzisionen. Episio- tomie. Hohe Zange Credé. Baum- und Mutter- mundsnaht	Mutter: Atonia uteri. Hintere Scheidenwand um die Portio herum tief eingerissen. Kind: schwer asphykt., nicht wieder belebt
Wendung.												
23. 08/09. Pol. 851	25	I. p.	c. d. 10,5	—	I. Schl.	—	60½	Hinter- scheitel- bein- einstellung	—	K. tot	Wendung. Damm- naht	Mutter verweigert die Aufnahme i. d. Klinik, Dammriß II. Gr. Kind: großer, harter Kopf
Perforation.												
24. 10/11. Pol. 507	27	I. p. Rhachitis. Mit 28 Jahren Pleuritis u. Spitzenbc.	c. d. 10,5	—	I. Schl.	—	54½	Kind bei Ankunft der Poliklinik tot	—	K. tot	Perforation Extraktion mit dem Cranio- clasten	Kind: starke Kopf- geschwulst
25. 08/09. Kl. 653	23	I. p. Zangenversuch ist dem Privat- arzt mißglückt	c. d. 11	—	II. Schl.	—	68½	Kind bei Ein- lieferung	1. 10. Tag Tempe- raturen bis 38,8	M. tot, 3300, L. 55, K. U. 34, Sch. U. 36	Perforation Extraktion mit dem Cranio- clasten	Fruchtwasser übel- riechend.

26. 08/09. 22 Kl. 839	I. p. 25.5 29 19 c. d. 11	—	I. Schl.	—	vor- einstellung. Drohende Asphyxie der Mutter. Dauer- kontrak- tionen. Keine Herz- töne, Kon- traktions- ring	4. Tag 12 schwache, Puls 132, des- orientiert. Status subfebrilis, riechende, Loechien, Thrombose der Hinken saphena am 5. Tage	a. u. 0. 220, L. 56	mit dem Cranioclas- ten. Credé. Dammnaht	Atonia uteri, Damm- riß II. Gr. Kind: harter Kopf, mäßige Kopfgeschwulst
27. 10/11. Kl. 425	I. p. 24,5 28 c. d. 11	—	I. Ge- sichts- lage	—	39 Herztöne nicht zu hören. Febris intra- partum: 12 St. a. p. 39,9 3 St. a. p. 38,0	2.—8. Tag T. zwischen 38,2 u. 39,9	K. tot, 3620, L. 53	Porforation Extraktion mit dem Cranioclas- ten. Cervixnaht	Mutter: klein. Cervixriß, Versuch eine Hinterhaupts- lage herzustellen mißlingt.

Sectio transperitonaealis cervicalis.

28. 09/10. Kl. 298 Gyn. 349	I. p. Rhachitis, mit 4 Jahren laufen gelernt 24,5 28 17,5 10,5 c. v. 8,5 B. E. 10 B. M. 10,5 B. A. 7—8	—	II. Schl.	vor- zeitig	4 Hinter- scheitel- beinein- stellung. Kontrak- tionsring	8. Tag riechende Loechien. 1.—7. Tag 37,9—38,2 Puls um 20. 8. Tag 38,8, Puls 132. 9.—12. Tag um 35,4. Puls um 124.	M. lebt, 3440, L. 50, K. U. 36,5, Schr. U. 40, Gr. D. 12, Gr. schr. 14,5, Kl. schr. 9,5, Gr. qu. 10, Kl. qu. 8	Sectio cervicalis transperi- tonealis	Mutter: klein, rechts- seitige Kyphoskoliose, Zeichen überstandener Rhachitis. Extraperitoneal zu bleiben mißlingt. Entlassungsbefund: Uterus anteflektiert. Narbe vollständig geschlossen. Keine Klagen
29. 09/10. Kl. 510 Gyn. 214	I. p. Mit 21 Jahren Polyarthrit. rheumatica. Willlebendes Kind 24 25,5 17,5 c. d. 10,5—11	stark vor- springend	I. Schl.	—	49 ² Kopf nach rechts ab- gewichen, Hinter- scheitel- beinein- stellung, Mekonium- abgang, Herz- töne 100	3.—6. Tag T. um 38,0. 6. Tag 120 Puls.	M. lebt, 3230, L. 53, K. U. 36, Sch. U. 38,5, Gr. D. 11,5, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 10, Kl. qu. 8	Sectio cervicalis transperi- tonealis	Mutter: klein, rechts- seitige Kyphoskoliose, Zeichen überstandener Rhachitis. Extraperitoneal zu bleiben mißlingt. Entlassungsbefund: Uterus anteflektiert. Narbe vollständig geschlossen. Keine Klagen

33. 09/10. Kl. 507 Gyn. 157	I. p. Vateran fbc.f. Mit 1 1/2 Jahren laufen gelernt. Typhus abdomi- nalis, Ohorea minor. Mit 20 Jahren Polyarthritis u. rheumatica u. Endocarditis	23 17,5 c. v. 8,5 B. E. 11 B. M. 10 B. A. 6	I. Schl. Becken stark vor- springend	—	27 1/2	Mekonium- haltiges Frucht- wasser. Sehr ab- geht ab. Sehr ver- langsamte Herztöne. Kind sehr geschädigt	unabg. Herz- töne 160. Kontrak- tionsring	P. um 112 Sch. U. 38, Gr. D. 12. Gr. schr. 14, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 8	cervicalis extraperi- tonealis	starke Kopfgeschw., leicht asphyktisch. Am 9. Tage: Bauch- naht völlig vereitert, knaft handbreit
34. 09/10. Kl. 919 Gyn. 769	I. p.	c. d. 11	I. Schl.	—	27 1/2	Mekonium- haltiges Frucht- wasser. Sehr ab- geht ab. Sehr ver- langsamte Herztöne. Kind sehr geschädigt	Blase verdünn. 2 Tage lang Dauer- katheter. 4. Tag 38,0. zwischen den Nähten. Nähte entfernt	M. tot, 3100, L. 51	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Kind: große Kopf- geschwulst, leichten- schlaf, Wieder- belebungsversuche vergeblich. Entlassungsbefund: Keine Beschwerden. Narbe fest. Eine 1 cm lange Granulation am unteren Narbende. Uterus mit der Bauch- wand verwachsen.
35. 10/11. Kl. 265 Gyn. 273	I. p.	24 18 c. d. 11,5	I. Stirn- lage	—	20 1/2	Dauer- kontrak- tionen. Mekonium im Frucht- wasser. Herztöne 100, schwan- kend	o. B.	K. lebt, 3420, L. 51, K. U. 37, Sch. U. 39, Gr. D. 12, (r. schr. 13,5, Kl. schr. 10,5, Gr. qu. 10, Kl. qu. 9 2/3,	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Kind: großer, starker Kopf; schwer asphyk- tisch, schreit erst nach 3/4 Stunden. Entlassungsbefund: Uterus anteilektiert, Narbe linear, fest. Uterus in der Gegend des unteren Wund- winkels fixiert
36. 10/11. Kl. 713 Gyn. 683	I. p. Als Kind schwächlich. Mit 2 Jahren lauf. gelernt. Wünscht lebend. Kind	27 29 21 c. d. 10,5	I. Schl.	—	20	—	2. Tag Bronchitis. 3. Tag 38,8. 4. Tag 37,2. Puls 104. Lungen- infarkt. 13. Tag Bauch- decken- blasenfistel	K. lebt, 2500, L. 50, K. U. 35, Sch. U. 29, Gr. D. 11,5, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Kind: zu großer Kopf. Bleich asphyktisch, stark mit Mekonium besudelt. Entlassungsbefund: Wunde fast völlig ge- schlossen. Keine Be- schwerden. Normale Temperatur. Uterus in Mittelstellung

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
37. 10/11. Kl. 1143 (syn. 912)		I. p.	26 28 21 c. d. 11	—	I. Schl.	—	37	Hinter- scheitel- bein- einstellung. Mekonium- abgang. Herztöne 84. schwan- kend	1.—7. Tag um 38,0, höchste 38,3	K. lebt, 3320, L. 51, K. U. 35,5, Sch. U. 39, Gr. D. 12, Gr. schr. 13 $\frac{3}{4}$, Kl. schr. 10 $\frac{1}{4}$, Gr. qu. 9 $\frac{3}{4}$, Kl. qu. 9	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Kind: bleich asphyk- tisch, fast ohne Herz- schlag, wiederbelebt. Entlassungsbefund: Geheilte Operations- wunde mit vernarbter Fistel am unteren Wundrande. Uterus anteflektiert. Keine Beschwerden.
38. 08/09. Kl. 568	32	I. p.	24 27 16 11 c. v. 9,5	Pro- mon- torium tief- stehend	a) II. Steiß- lage b) I. Schl.	—	6 $\frac{1}{2}$	Zwillinge. Placenta praevia lateralis. Geringe Blutung. Alb. 10 $\frac{0}{100}$.	2 Std. p. part. a) K. lebt, 1700, L. 43, a) Extrak- Exitus der K. U. 30, Sch. U. 29, tion, Mutter. Sektion: Gr. D. 10, Gr. schr. 12, b) Wen- Anaemisch. Kl. schr. 10 $\frac{1}{2}$, dung. parenchy- Gr. qu. 9, Kl. qu. 8, Credit matische b) K. tot, 1800, L. 45, Organe. K. U. 31, Sch. U. 28 Blutung ins Epicard. Schlafes Herz. Keine Ruptur	Mutter: klein, rachitischer Rosen- kranz. — Kind: a) schwer asphyk- tisch, 3 Tage post part. f. Sektion: negativ. b) † geboren		

Zwillinge.

II. Mehrggebärende.
Spontangeburt.

39. 08/09. Pol. 779	28	IV. p. I. part. Hydro- cephalus, Tot- geburt. II. u. III. part. spontan	c. d. 11	—	I. Schl.	—	—	T. 38,0 intra partum	—	K. lebt	—	Spontangeburt
40. 08/09. Pol. 908	25	IV. p. 2 part. spontan. 1 Abort. Rhechitis	c. d. 11	platt	I. Schl.	—	19	—	—	K. lebt	—	Spontangeburt. Mittelm.

I. u. 1000	II. part. Ge- sichts- lage, Wendung	IX. p. 4 Aborte, 2 Zang. 1 Spontangeb., 2 mal Wendung mit Perforation d. nachfolgend. Kopfes. Rhachitis, mit 3 Jahren laufen gelernt	24 27 19 c. d. 10,5	—	II. Schl.	—	62	Mekonium- abgang	—	M. lebt, 3520, L. 53, K. U. 37, Sch. U. 39, Gr. D. 12, Gr. schr. 17, Kl. schr. 9,5, 7,5 Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5	Lange lage	Beliegt nicht. Kind: starke Kopfgeschwulst
42. 09/10. Pol. 439 Kl. 443	36	IX. p. 4 Aborte, 2 Zang. 1 Spontangeb., 2 mal Wendung mit Perforation d. nachfolgend. Kopfes. Rhachitis, mit 3 Jahren laufen gelernt	24 27 19 c. d. 10,5	—	II. Schl.	—	62	Mekonium- abgang	—	M. lebt, 3520, L. 53, K. U. 37, Sch. U. 39, Gr. D. 12, Gr. schr. 17, Kl. schr. 9,5, 7,5 Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5	—	Spontangeburt. Walchersche Hänge- lage ohne Erfolg. Kind: asphyktisch
43. 09/10. Pol. 720	45	VI. p. 4 part. spont. 1 part. Zange	c. d. 11,5	—	I. Schl.	—	46 ³ ₄	Hinter- scheitel- bein- einstellung	—	K. lebt	Credé	Atonia uteri. Kind: tief asphykt., Kopfgeschwulst, Spontangeburt
44. 09/10. Pol. 754	39	IX. p. 7 part. spont. 1 Zange	c. d. 11,5	—	II. Schl.	—	37 ³ ₄	—	—	K. lebt, 3500, K. U. 37	—	Spontangeburt
45. 10/11. Pol. 34	26	II. p. I. part. Per- foration	c. d. 11	—	I. Schl.	—	—	—	—	M. lebt	Walchersche Hängelage, Hofmeister- sche Impression	Spontangeburt
46. 10/11. Pol. 400	34	II. p.	26 30 19,5 11,5 c. v. 9 B. E. 10,5 B. M. 9 B. A. 8	—	I. Schl.	—	—	—	—	K. lebt	—	Spontangeburt
47. 10/11. Pol. 564	39	IX. p. 4 Zangen, 1 Abort	c. d. 10,5	—	I. Schl.	—	—	—	—	K. lebt	Mannelle Plazentar- lösung	Retentio placentae. Kind: Kopfgeschw. Spontangeburt

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
48. 10/11. Pol. 746	33	VII. p. I. part. Zange. II.—IV. part. spontan. V. part. Zange. VI. part. Früh- geburt 6. Mon. 4. Kind starb bald	26 29 17 c. d. 11	—	II. Schl.	—	13 $\frac{3}{4}$	—	—	M. lebt, 2900, L. 50, K. U. 34	—	Mutter: Spitzbauch, Kyphoskoliose. Kind: große Kopf- geschwulst
49. 08/09. Kl. 34	20	II. p. Rhachitis, mit 1 $\frac{1}{2}$ J. laufen gelernt. I. part. spont.	24 26 18 c. d. 11	Pro- motor. leicht er- reich- bar	I. Schl.	—	16 $\frac{1}{2}$	Hinter- scheitel- bein- einstellung	3. Tag 38,2 6. Tag 38,5	K. lebt, 3210, L. 51, K. U. 33, Sch. U. 33,5, Gr. D. 11,5, Gr. schr. 13, Kl. schr. 9 $\frac{3}{4}$, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5	—	Spontangeburt. Mutter: Rhachitisch. Rosenkranz
50. 08/09. Kl. 94	26	II. p. Rhachitis, spät laufen gelernt. In letzter Zeit lungenkrank. Chlorose. I. part. spontan	c. d. 11	—	I. Schl.	—	4 $\frac{1}{4}$	Bronchitis	4. Tag 38,1, 5. Tag 38,4	K. lebt, 2950, L. 49, K. U. 36, Sch. U. 33, Gr. D. 11, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 8 $\frac{1}{2}$, Kl. qu. 7 $\frac{1}{4}$	—	Mutter: klein, grazil, Tibiae säbelartig verkrümmt, Kyphoskoliose. Spontangeburt
51. 08/09. Kl. 125	27	III. p. Mit 4 Jahren laufen gelernt. I. part. schwer, spontan; Kind 6 Monate alt +, II. part. Forzepe, Kind 4 Monate alt +	24 27 17,5 c. d. 10 $\frac{1}{2}$	—	I. Schl.	—	32	Pfeilnaht der Symphyse genähert	o. B.	M. lebt, 3100, L. 51, K. U. 33, Sch. U. 38, Gr. D. 11, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 8 $\frac{3}{4}$, Kl. qu. 8	—	Mutter: angedentet., rachitischer Rosenkranz. Spontangeburt
52. 08/09. Kl. 254	26	II. p. I. part. spont.	24 29,5 17 $\frac{3}{4}$ c. d. 10,5	All- ge- mein	I. Schl.	vor- zeitig	7 $\frac{1}{4}$	—	o. B.	K. lebt, 3660, L. 56, K. U. 37, Sch. U. 36, Gr. D. 11,5, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 8 $\frac{3}{4}$, Kl. qu. 8	—	Kind: leicht asphyktisch.

54. 08/09. Kl. 309	25	III. p. Spät laufen gelernt. 2 part. Zange	—	I. Schl.	—	25	Hinter- scheitel- bein- einstellung	o. B.	Sch. U. 33, Gr. D. 11, Gr. schr. 12,5, Kl. schr. 9 $\frac{3}{4}$, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5 K. lebt, 3880, L. 55, K. U. 36, Sch. U. 41, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10, Gr. qu. 10 $\frac{1}{4}$, Kl. qu. 9 $\frac{1}{4}$	—	Spontangeburt	schonkel, schlechte Zähne. Spontangeburt
55. 08/09. Kl. 328	19	II. p. Mit 3 Jahren laufen gelernt	—	I. Schl.	—	4 $\frac{3}{4}$	—	o. B.	K. lebt, 3250, L. 50, K. U. 35, Sch. U. 36, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10,5, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	—	Spontangeburt. Mutter: grazil	
56. 08/09. Kl. 329	23	II. p.	—	I. Schl.	—	15 $\frac{3}{4}$	—	o. B.	M. lebt, 3100, L. 50, K. U. 34, Sch. U. 38, Gr. D. 11, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9 $\frac{1}{4}$, Kl. qu. 8 $\frac{1}{4}$	—	Spontangeburt. Mutter: klein, rhachitische Veränderungen	
57. 08/09. Kl. 330	22	II. p. Spät laufen gelernt. Vor 2 Jahren Polyarthritits rheum. I. part. spont.	—	I. Schl.	—	27 $\frac{3}{4}$	—	o. B.	K. lebt, 4170, L. 54, K. U. 36, Sch. U. 45, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 11, Gr. qu. 10, Kl. qu. 9	—	Mutter: krumme Beine. Spontangeburt	
58. 08/09. Kl. 366	23	II. p. Im 2 J. laufen gelernt. Pneur- monie m. 13 J. I. part. Per- foration	—	II. Schl.	—	48 $\frac{1}{2}$	—	vom 9. Tage ab riechende Lochien 10. Tg 37,6	K. lebt, 3370, L. 54, K. U. 37, Sch. U. 37, Gr. D. 12, Gr. schr. 15, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 8	—	Mutter: kl., 158 cm. Kind: ziemlich große Kopfgeschwulst. Spontangeburt	

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
59. 08/09. Kl. 435	33	V. p. Im 2. Jahre lauf. gelernt. I. part. Zange, and. normal	24 26 19 c. d. 11	Kreuz- bein ab- ge- knickt	I. Schl.	—	28	—	o. B.	K. lebt, 4100, L. 53, K. U. 36, Sch. U. 40, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10 $\frac{1}{2}$, Gr. qu. 9 $\frac{1}{4}$, Kl. qu. 8 $\frac{1}{4}$	—	Spontangeburt
60. 08/09. Kl. 549	40	III. p.	25 27 20 c. d. 11	—	II. Schl.	—	6 $\frac{1}{2}$	Puerperal- psychose	o. B.	K. lebt, 3570, L. 52, K. U. 35, Sch. U. 36,5, Gr. D. 11, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10, Gr. qu. 10, Kl. qu. 8	—	Spontangeburt. Mutter: Suicid- versuch, Verlegung in die psychiatrische Klinik
61. 08/09. Kl. 594	35	V. p. I. part. Quer- lage, Perforation, II-IV. part. spontan. I. part. Eklampsie	c. d. 11	—	I. Schl.	—	38 $\frac{1}{2}$	—	o. B.	K. tot, 2750, L. 51, K. U. 34, Sch. U. 33	—	Mutter: grazil. Kind: tief asphyktisch, nicht wiederbelebt. Sektion: kleines, sub- durales Hämatom an der link. Hälfte der Schädel- basis um das Foramen magnum herum. Todesursache: Asphyxie
62. 08/09. Kl. 649	26	II. p. Rhachitis, mit 3 Jahren laufen gelernt. I. part. 4 Tage nach Blasen- sprung spontan	26 28 19 11 c. v. 9,5 B. E. 10 B. M. 11 B. A. 9	—	I. Schl.	—	26	—	o. B.	M. lebt, 3700, L. 53, K. U. 35, Sch. U. 38, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	—	Mutter: klein, grazil. Spontangeburt
63. 08/09. Kl. 741	22	II. p. I. part. spont.	24 27 18,5 c. d. 11,5	—	I. Schl.	—	80 $\frac{1}{2}$	—	o. B.	M. lebt, 2850, L. 50 $\frac{1}{2}$, K. U. 34, Sch. U. 34,5, Gr. D. 11 $\frac{1}{2}$, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	—	Mutter: klein. Spontangeburt

65. 08/09. Kl. 834	29	laufen gelernt. I. part. Sym- physeotomie, Weichenbett feberhaft, Kind $\frac{1}{4}$ J. alt $\frac{1}{4}$. II. part. Früh- geburth mens. VII. Kind nach $\frac{1}{4}$ J. $\frac{1}{4}$.	21 26 20 11$\frac{1}{4}$ c. v. 9,5 B. E. 10 B. M. 10,5 B. A. 8,5	—	I. Schl.	—	8 $\frac{3}{4}$	o. B.	K. lebt, 3440, L. 50, K. U. 34, Sch. U. 38$\frac{1}{2}$, Gr. D. 11, Gr. schr. 13$\frac{1}{2}$, Kl. schr. 9, Gr. qu. 8$\frac{1}{4}$, Kl. qu. 7	Walcher- sche Hänge- lage	Spontangeburt. Kind: leicht asphyktisch
66. 09/10. Kl. 91	24	II. p. I. part. Per- foration	23 25 18 c. d. 10,5	—	II. Schl.	—	21 $\frac{1}{2}$	o. B.	M. lebt, 3270, L. 51,5, K. U. 35,5, Sch. U. 36, Gr. D. 11,5, Gr. schr. 13,5, Kl. schr. 10, Gr. qu. 10, Kl. qu. 8	—	Spontangeburt. Mutter: klein. Walcher gelingt nicht. Kind: Impression a. d. rech. Scheitelbein
67. 09/10. Kl. 99	24	III. p. Rhachitis, mit 4 Jahren laufen gelernt. I. part. spontan. II. Kind lebt. II. part. Nabel- schnurvorfal, Forzepts, Kind $\frac{1}{4}$	26 27 16 10$\frac{1}{4}$ c. v. 8$\frac{1}{4}$ B. E. 10,5 B. M. 11 B. A. 9,5	Pro- monitor. scharf vor- sprin- gend	I. Schl.	—	19 $\frac{3}{4}$	o. B.	M. lebt, 3030, L. 51, K. U. 35, Sch. U. 36, Gr. D. 12, Gr. schr. 13$\frac{1}{4}$, Kl. schr. 9$\frac{1}{4}$, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	—	Spontangeburt. Mutter: sehr klein, Skoliose, Tibiae verkrümmt. Kind: asphyktisch, große Kopf- geschwulst
68. 09/10. Kl. 136	23	III. p. I. part. spont. II. part. Forzepts	22 26 18 10,5 c. v. 9-9$\frac{1}{4}$ B. E. 10,5 B. M. 11 B. A. 9	—	I. Schl.	—	17	o. B.	K. lebt, 3660, L. 51, K. U. 37, Sch. U. 40, Gr. D. 12, Gr. schr. 14$\frac{1}{2}$, Kl. schr. 10$\frac{1}{2}$, Gr. qu. 10, Kl. qu. 9$\frac{1}{4}$	—	Spontangeburt. Mutter: klein, Hängebauch. Kind: große Kopfgeschwulst

Titel. No. Jahrgang. Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
69. 09/10. Kl. 215	26	III. p. Spät laufen gelernt. 2 part. spont.	23 27 19 10,5 c. v. 9,5 B. E. 11,5 B. M. 11 B. A. 9	—	II. Schl.	—	3½	—	o. B.	K. lebt, 2950, L. 51, K. U. 36, Sch. U. 36, Gr. D. 12, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 10, Kl. qu. 9,5	—	Mutter: sehr klein, Hängebauch. Spontangeburt
70. 09/10. Kl. 399	25	II. p.	28 30 19 10,5 c. v. knapp 9	—	II. Schl.	—	16½	—	o. B.	K. lebt, 3200, L. 53, K. U. 36, Sch. U. 39, Gr. D. 12½, Gr. schr. 14½, Kl. schr. 10¾, Gr. qu. 9¾, Kl. qu. 8¾	—	Spontangeburt
71. 09/10. Kl. 407	30	II. p.	25 29 21 11¼ c. v. 9,5 B. E. 12 B. M. 12 B. A. 9	—	I. Schl.	—	30½	—	o. B.	K. lebt, 3860, L. 53, K. U. 37, Sch. U. 44, Gr. D. 12¼, Gr. schr. 14, Kl. schr. 11, Gr. qu. 10¾, Kl. qu. 10	—	Spontangeburt
72. 09/10. Kl. 456	25	II. p. I. part. Forzepts	24 26 18 10,5 c. v. 8¾ B. E. 11,5 B. M. 10,5 B. A. 9	—	II. Schl.	—	41½	—	4. Tag 38,1 10. Tag 38,6	K. lebt, 3740, L. 53, K. U. 35,5, Sch. U. 40, Gr. D. 11,5, Gr. schr. 14, Kl. schr. 9,5, Gr. qu. 9¼, Kl. qu. 8	—	Mutter: etwas gekrümmte Unterschenkel. Spontangeburt
73. 09/10. Kl. 515	33	II. p. Chlorose. I. part. spont.	c. d. 10 c. v. 9¼ B. E. 11,5 B. M. 9,5 B. A. 6,8	—	II. Schl.	vor- zeitig	9¼	Kopf etwas nach links ab-	o. B.	M. lebt, 2810, L. 48,5, K. U. 35,5, Sch. U. 36, Gr. D. 12, Gr. schr. 13	—	Mutter: klein. Kind: Kopfgeschw. Spontangeburt

Kl. 523	75. 09/10. Kl. 553	Mit 3 Jahren lauf. gelernt. I. part. 2monatlicher Abort	c. v. 9,5	—	I. Schl.	vor- zeitig	8 $\frac{1}{4}$	—	3. u. 4. Tag T. bis 37,7. Riechende Lochien	Gr. D. 11,5, Gr. schr. 13,5, Kl. schr. 9 $\frac{1}{4}$, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5	—	Spontangeburt. Mutter: Zeichen überstandener Rhachitis
	76. 09/10. Kl. 611	II. p. Rhachitis, mit 1 Jahr laufen gelernt	25 27 19 11,5 c. v. 9,5 B. E. 12 B. M. 10,5 B. A. 9,5	—	I. Schl.	—	4 $\frac{1}{4}$	Kopf auf das linke Darmbein ab- gewichen	o. B.	M. lebt, 3100, L. 50, K. U. 35, Sch. U. 37, Gr. D. 11,5, Gr. schr. 14,5, Kl. schr. 10, Gr. qu. 8,5, Kl. qu. 7,5	—	Spontangeburt
	77. 09/10. Kl. 623	VII. p. I. und II. part. spontan. III. part. Querl. IV. part. Früh- geburt i. 8. Mon. V. u. VI. part. Querlage. 4 Kinder leben	24 26 18,5 c. d. 10,5	—	I. Schl.	—	9 $\frac{3}{4}$	—	o. B.	K. lebt, 2900, L. 50, K. U. 37, Sch. U. 37, Gr. D. 11 $\frac{3}{4}$, Gr. schr. 13 $\frac{3}{4}$, Kl. schr. 10 $\frac{1}{4}$, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 8,5	—	Spontangeburt
	78. 09/10. Kl. 630	II. p. Mit 17 Jahren Chlorose. 2 p. Forzepts, Kinder leben	22 26 18 c. d. 10,5	—	I. Schl.	—	24 $\frac{1}{4}$	—	o. B.	M. lebt, 3390, L. 52, K. U. 36, Sch. U. 40, Gr. D. 12, Gr. schr. 13,5, Kl. schr. 9 $\frac{3}{4}$, Gr. qu. 9 $\frac{3}{4}$, Kl. qu. 8	—	Spontangeburt. Mutter: Zeichen überstandener Rhachitis
	79. 09/10. Kl. 666	II. p. I. part. Abort. mens. V.	24 26 19 c. d. 10,5	—	I. Schl.	—	6 $\frac{1}{2}$	—	o. B.	M. lebt, 2550, L. 47, K. U. 34,5, Sch. U. 35, Gr. D. 11, Gr. schr. 12,5, Kl. schr. 9, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5	—	Spontangeburt

Life. No. Jahrgang. Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
80. 09/10. Kl. 675	28	IV. p. I. part. Forzepts. II. part. Nar- kose, Kunsthilf. III. part. Nar- kose, Kunsthilf. Kinder lebend geboren	c. e. 19 c. d. 11	Pro- motor. hoch- steh- end, stark vor- spring.	I. Schl.	—	35½	—	o. B.	K. lebt, 3800. L. 53, K. U. 38, Sch. U. 43, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10, Gr. qu. 10, Kl. qu. 9	—	Mutter: klein. Kind: Druckmarken am linken Scheitel- bein und unterhalb des rechten Ohres. Spontangeburt
81. 10/11. Kl. 143	35	VI. p. Als Mädchen Chlorose. I. Meneses mit 23 Jahren. I. part. Unfall. Kind + im 8. Monat geb. II. part. Forzepts Kind + geb. III. - V. part. spontan. Kinder leben	25 28 18 10½ c. v. 9½ B. E. 12 B. M. 10 B. A. 9	—	I. Schl.	—	50½	—	2. Tag 38,2	K. lebt, 3450. L. 53, K. U. 37, Sch. U. 40, Gr. D. 12,5, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10, Gr. qu. 8,5, Kl. qu. 7,5	—	Spontangeburt. Mutter: klein
82. 10/11. Kl. 381	27	III. p. Rhachitis. I. part. spont. II. part. Quer- lage. Kinder leben	20 24 17 c. d. 11	—	I. Schl.	—	23½	—	o. B.	M. lebt, 2600. L. 48, K. U. 34, Sch. U. 36, Gr. D. 12, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 8	—	Spontangeburt. Mutter: klein
83. 10/11. Kl. 914	29	IV. p. Rhachitis, Skrophulose. I. part. spontan. II. part. Wen- dung, Perforat. des nachfolgen- den Kopfes. III. part.	25 27 20 c. d. 11	—	I. Schl.	—	19½	—	o. B.	K. lebt, 3500. L. 50, K. U. 36, Sch. U. 38, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 9,5, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7½	—	Spontangeburt. Mutter: linke os pubis zeigt einen klaffenden Spalt, dessen Enden bewegl.

34. 10/11. Kl. 1050	36	II. p. Mutter a. The. + Rhachitis, mit 4 Jahren laufen gelernt. I. part. lange Dauer	26 16 c. v. 9 B. E. 11 B. M. 11 B. A. 7	—	I. Schl.	—	18 $\frac{1}{2}$	—	o. B.	K. lebt, 2600, L. 49, K. U. 34, Sch. U. 33, Gr. D. 11, 5, Gr. schr. 13 $\frac{1}{4}$, Kl. schr. 9, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7 $\frac{1}{4}$	Mutter: sehr klein, Kyphoskoliose
------------------------	----	--	--	---	----------	---	------------------	---	-------	---	--------------------------------------

Zange.

85. 09/10. Pol. 639	31	III. p. I. part. gemini. spontan. II. part. Kunst- hilfe. Mit 3 Jahren laufen gelernt	c. d. 10,5	—	I. Schl.	vor- zeitig	—	Kopf auf die linke Darmbein- schaufel ab- gewichen	—	K. lebt	Hofmeier- sche Impress. Forzepts	Impression gelingt. Kind: groß, große Kopfgeschwulst
86. 10/11. Pol. 449	39	VI. p. 2 part. spont. 3 mal Zange	c. d. 11	—	I. Schl.	vor- zeitig	17 $\frac{1}{2}$	Herztöne schwan- kend	—	K. tot	Forzepts	Mutter: Hängebauch. Kind: große Kopf- geschwulst, asphykt., nicht wiederbelebt
87. 09/10. Kl. 125	23	II. p.	25 28 20 10 c. v. 9 $\frac{1}{4}$ B. E. 11 B. M. 11,5 B. A. 8,5	—	I. Schl.	—	21 $\frac{1}{2}$	Mekonium- abgang. Herztöne stark ver- langsamt, unregel- mäßig	o. B.	K. lebt, 4070, L. 56, K. U. 35, Sch. U. 44, Gr. D. 12, Gr. schr. 14 $\frac{1}{4}$, Kl. schr. 10 $\frac{1}{2}$, Gr. qu. 9 $\frac{1}{2}$, Kl. qu. 9	Forzepts	Kind: sehr großer Kopf
88. 10/11. Kl. 390	36	VII. p. 2 part. mit Arzt. Kinder leben	25 27 17 10 c. v. 8 $\frac{3}{4}$ B. E. 11 B. M. 10 B. A. 9	—	I. Schl.	—	5 $\frac{1}{4}$	Mekonium- abgang, Herztöne 80—115	o. B.	K. lebt, 3400, L. 51, K. U. 34, Sch. U. 33, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10 $\frac{1}{2}$, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5	Forzepts	—
89. 10/11. Kl. 1017	24	III. p. I. part. spont. II. part. Forzepts	27 28 18 10 c. v. 9 $\frac{1}{4}$	—	II. Schl.	—	11 $\frac{1}{2}$	Nabel- schnur- vortall. mekonium- haltiges Frucht- wasser	6. u. 8. T. T. bis 39,4. K. U. 35, Sch. U. 41, Riechende Lochien Kl. schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	Kopf schon eingetreten. Kind: asphyktisch	Forzepts	

Leide. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
90. 10/11. Pol. 668	37	XII. p. 1mal Zange, 2 Querlagen, 2 Steißlagen, (1mal mit Per- foration des nachfolgenden Kopfes)	c. d. 10,5	—	I. Schl.	—	—	Hohe Zange. Nabel- schnur- vorfall	—	K. lebt, 3200, L. 51	Narkose, hohe Zange	Kind: stark asphyktisch
91. 09/10. Kl. 914 Gyn. 721	33	VIII. p. Rhachitis, mit 3 Jahren laufen gelernt. Vater an Typh. t. I. part. spontan. Kind + geboren. II. u. III. part. spontan, kleine Kinder, leben. IV. part. Steiß- kleines Kind, nach 10 Woch. t. V. part. Wen- dung, Kind t. VI. part. spont. groß. Kind lebt. VII. part. Wen- dung, Perforat. des nachfolgen- den Kopfes	c. d. 11,5	—	I. Schl.	—	74½	Mekonium- abgang	28. Tag: Gehen erschwert	M. lebt, 3600, L. 53, K. U. 37, Sch. U. 41, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10,5, (tr. qu. 10½, Kl. qu. 10	Hebo- steotomie, hohe Zange, Scheiden- naht über Jodoform- docht	Walchersche Hänge- lage, ohne Erfolg. Scheide reißt beim Auseinanderklaffen 8—10 cm ein. Entlassungsbefund: Geringe Diastase, auf Druck schmerzhaft. Uterus anteflektiert
92. 10/11. Kl. 7	32	III. p. Vater an Herz- u. Nierenkrank- heit t. Rhachitis, mit 3 J. lauf. gelernt. Mit 14 J. Chlo- rose, Ver- krümmung der Wirbelsäule	25 27 17 11 c. v. 9 B. E. 10 B. M. 7,5 B. A. 7	—	II. Schl.	—	10¼	Alb. 12½/100, Herz- schwäche der Mutter	3. Tag 38,1	K. lebt, 2420, L. 48,5, K. U. 34, Sch. U. 34, (tr. l.) 11, Gr. schr. 12,5, Kl. schr. 9, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 8	Künstl. Früh- geburts- Hyster- euryse, hohe Zange	Mutter: kl., 136 cm, Kypskoiose, Struma mäßigen Grades

93. 10/11. Kl. 1083	29	Nieren- und Blasenleiden, Herzschwäche. I. part. praemat. 32. Woche weg. 14 ⁰ / ₁₀ Alb. Kind totgeb. or.	22 24 17 11 c. v. 9 B. E. 11 B. M. 11 B. A. 7	—	II. Schl.	—	13 ¹ / ₂ Herzöne 80	o. B.	M. lebt, 25/20; L. 48, K. U. 33, Sch. U. 35, Gr. D. 11, Gr. schr. 13, Kl. schr. 9,5, Gr. qu. 9 ¹ / ₂ , Kl. qu. 8	hohe Zange (Tarnier) Narkose	Mutter: klein, rhachitisch Knochenbau. Wahrscheinliche Hänge- lage ohne Erfolg. Kind: Asphyxie
------------------------	----	--	--	---	-----------	---	--	-------	---	---------------------------------------	---

Wendung.

a) Aus Kopflage.

94. 08/09. Pol. 2	37	III. p. Mit 3 J. lauf. ge- lernt, Krämpfe, vor 1 Jahr Lungenkatarrh I. part. Wendg. Kind †. II. part. Wendg. Kind lebt, skrophulös	c. d. 10,5	—	II. Schl.	—	Kopf nach links ab- gewichen. Fußvorfall, schlechte Herztöne	—	M. tot	Narkose, Wendung, Credé, Cervix- naht	Kr. wird während der Extraktion asphyktisch, während der künst- lichen Atmung stirbt das Kind ab. Cervixriß
95. 08/09. Pol. 236	42	XIV. p. 3 mal Zange, 2 mal Wendg. 6 Kinder leb.	c. d. 11	—	II. Schl.	vor- zeitig	Hinter- scheitel- bein- einstellung	—	K. lebt	Narkose, Wendung	Kind: asphyktisch, Schädelimpression
96. 08/09. Pol. 432	30	VI. p. 1 Abort. 1 Zange.	22 26 18 c. d. 10-11	Pro- monitor. vor- spring- gend	I. Schl.	—	19 ¹ / ₄ Hinter- scheitelbein- einstellung. Krampf- wehen	—	K. lebt	Wendung, Credé	Atonische Nach- blutung. Kind: schwer asphyktisch
97. 08/09. Pol. 707	39	V. p. 2 mal Per- ration, alle Kinder bis auf eins †	c. d. 11	—	I. Schl.	—	Kopf auf das rechte Darmbein ab- gewichen	—	M. lebt	Narkose, Wendung	Kind: leicht asphyktisch, Impression auf dem rechten Schläfenbein

Life. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
98. 08/09. Pol. 876	35	V. p. I. und II. part. spontan. Kinder leben. III. part. Kind †. IV. part. spont. Frühgeburt. Kind lebt	c. d. 10,5—11	—	I. Schl.	—	—	Kopf auf die linke Darmbein- schaufel ab- wichen. Linker Arm vorgefallen	—	M. lebt	Wendung	Kind: harter, großer Kopf, schwer asphyk- tisch, Impression des linken Scheitelbeins
99. 08/09. Pol. 989	45	VI. p. 3 mal Kunst- hilfe, 1 Kind lebt	c. d. 11	—	I. Schl.	vor- zeitig	—	Nabel- schnur- vorfall	—	K. tot	Narkose, Wendung	Nabelschnur pulslos, soll 15 Min. vorher noch pulsiert haben
100. 09/10. Pol. 37	31	VII. p. 1 mal Zwillinge. 1 mal Wendung	c. d. 11	—	I. Schl.	—	—	schlechte Herztöne	—	M. lebt	Narkose, Wendung	—
101. 09/10. Pol. 48	29	IV. p. 1 mal Zange, 1 mal spontan. 1 Abort. Rhachitis	c. d. 10,5	Pro- monitor. stark vor- spring- end	I. Stirn- lage	vor- zeitig	—	—	—	K. lebt, L. 50	Narkose, Wendung, Crédé	Mutter: alle Zeichen von Rhachitis, Sattel- nase. Atonia uteri. Kind: Klavikular- fraktur links, Druck- stellen v. Promontor. a. d. recht. Kopfseite
102. 09/10. Pol. 112	34	V. p. 3 part. spont. langdauernd. 1 Abort	c. d. 11	—	II. Schl.	—	—	—	—	M. lebt	Narkose, Wendung	Kind: harter Kopf, leicht asphyktisch
103. 09/10. Pol. 128	36	XIV. p. Letzter part. Kunsthilfe	c. d. 11	—	II. Stirn- lage	—	—	schlechte Herztöne	—	K. tot	Narkose, Wendung	Mutt.: Uterusruptur, Cervixriß groß, rechts hinten, keine Blutg., Einlieferung.

104. 09/10. 44 Pol. 657	X. p. 3 mal Kunst- hilfe	c. d. 11	I. Schl.	—	—	Hinter- schiebelbein- einstellung	—	K. tot, 4500, Sch. U. 43	Wendung, Mutter. Hängebauch
105. 09/10. 35 Pol. 710	IV. p. Rhachitis, mit 4 Jahren laufen gelernt. I. part. künstl. Frühgeburt im 9. Monat. II. part. Zange. III. part. Wen- dung	c. d. 10,5 c. v. 9	II. Schl.	—	—	Hinter- schiebelbein- einstellung. Mekonium- abgang	—	K. lebt	Wendung Kind: Impression an der rechten Schläfe, am 4. Tage Exitus: subdurales Hämatom
106. 09/10. 30 Pol. 713	VI. p. 1 Abort. 3 Spontan- geburten. 1 Wendung (Querlage)	27 29 18,5 c.d., 11,5 c.v., 10 B.E. 10 B.M. 11 B.A. 10	I. Schl.	Dop- pelt Pro- motor.	—	Nabel- schnur- vorf. all. Kopf auf die linke Becken- schaufel abgewich. Tiefer Pla- zentarsitz. Schlechte Herztöne	—	M. lebt	Narkose, Wendung Kind: leicht asphyktisch
107. 09/10. 29 Pol. 756	VI. p. 4 part. spont. 1 mal Quer- lage	c. d. 11	II. Schl.	—	—	Placenta praevia totalis	—	K. tot	Durch- bohrung der Plazenta, Hyster- euryse. Wendung, Perforation des nach- folgenden Kopfes Mutter: Seit 4 Tagen Blutung, Kollaps bei sehr starker Blutung. Kind: groß, Kopf geht nicht durchs Becken
108. 10/11. 29 Pol. 10	VI. p. part. spontan, langdauernd	c. d. 11	I. Schl.	—	vor- zeitig	Hinter- schiebelbein- einstellung. Kopf a. das r. Darmbein abgewichen.	174	K. lebt, 4300, l. 55, K. U. 37	Narkose, Wendung Walchersche Hänge- lage ohne Erfolg. Kind: asphyktisch
109. 10/11. 29 Pol. 194	II. p. f. part. Zange	c. d. 11	II. Schl.	—	—	Nabel- schnur- vorf. all	—	M. lebt	Wendung Kind: asphyktisch, rechter Arm Plexus- lähmung

Lfd. No. Jahrgang. Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	(Geburts- dauer) Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
110. 10/11. Pol. 275	25	II. p. I. part. Zange, Kind kurz p. part +	c. d. 10,5	—	I. Schl.	vor- zeitig	—	Nabel- schnur- vorfall	—	K. lebt, 3000	Narkose, Wendung	Kind: asphyktisch
111. 10/11. Pol. 511	27	VII. p. Rhachitis. 3 part. spont. 1 Frühgeburt. 1 Querlage. 1 Abort	sp. i. 27 cr. i. 29 c. v. 8,5	—	II. Schl.	—	—	Kopf nach links ab- gewichen	—	K. lebt, 3500, L. 54, K. U. 35	Narkose, Wendung, Credé, manuelle Lösung eines Plazentar- restes	Hofmeiersche Impression mißlingt. Mutter: cruravara, atonia uteri, Plazenta nicht vollständig. Kind: links Impression
112. 10/11. Pol. 634	27	V. p. I. — III. part. spontan. IV. part. Quer- lage, Wendg. 1 Kind lebt	26 28,5 18 c. d. 11	platt	II. Schl.	—	11 1/2	Tiefer Pla- zentarsitz. Hinter- scheitelbein- einstellung, Mekonium- abgang. Herztöne 90	—	K. lebt, 3500, L. 52, K. U. 35	Narkose, Wendung, Credé	Während der Wehen Blutung, heftige Blutung intra part. Atonia uteri. Kind: blau asphykt.
113. 10/11. Pol. 737	32	VIII p. 7 part. spont. 1 Kind lebt	c. d. 11 c v. 9	Pro- mon- torium hoch- stehend, scharf vor- sprin- gend. Sym- physen- knorpel springt 1 1/2 cm	I. Schl.	vor- zeitig	—	Nabel- schnur- vorfall, Herztöne 65	—	K. tot, 3700, L. 52, K. U. 37, Seb. U. 40, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10 1/2, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 7,5	Narkose, Wendung	Kind: tiefe Impress. auf dem linken Scheitelbein, kleine auf dem rechten

14. 08/09. Kl. 62	20, 2 19 c. d. 11	—	I. Schl.	—	16½ Album. + Hinter- scheidel- bein- einstellg.	o. L.	M. lebt, 2200, L. 52, K. U. 37, Sch. U. 36, Gr. D. 12, Gr. schr. 13,5, Kl. schr. 10½, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8,5	Wendung, Credé, Damm- naht	Mutter: Andeutung. von Rhachitis, Atonia uteri, Dammriß II. Gr. Kind: große Kopfge- schwulst, schwer asphyktisch
115. 08/09. Kl. 294	24,5 27,5 16,5 11,5	mäßig ver- engt	II. Schl.	—	15 Hinter- scheidel- bein- einstellg.	o. B.	K. lebt, 3630, L. 54, K. U. 37, Sch. U. 38, Gr. D. 12, Gr. schr. 13½, Kl. schr. 10½, Gr. qu. 10, Kl. qu. 9	Narkose, Wendung, Credé	Mutter: klein, rhachitisch. Rosen- kranz. Atonia uteri. Kind: leicht asphyktisch
116. 08/09. Kl. 634	c. d. 11	—	I. Schl.	—	3½ Kopf nach 3. Tag 38.1. links ab- gewichen. Arm- vorfall	3. Tag 38.1. Riechende Lochien	M. lebt, 2700, L. 52, K. U. 33½, Sch. U. 33½, Gr. D. 11, Gr. schr. 13, Kl. schr. 9, Gr. qu. 8½, Kl. qu. 7½	Narkose, Wendung	Arm nicht reponibel. Kind: leicht asphyktisch
117. 09/10. Kl. 333	23 27 18 10 c. v. 8½-8¾ B. E. 12 B. M. 11,5 B. A. 9	—	II. Schl.	—	5½ Nabel- schnur- vorfall, Mekonium- abgang, Herztöne sehr schnell, kaum hör- bar. Nabel- schnur pulslos	o. B.	M. lebt, 3400, L. 52, K. U. 36, Sch. U. 41, Gr. D. 11½, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9½, Kl. qu. 9	Wendung, Credé, Damm- naht	Mutter: klein, schwächlich, rhachitischer Rosenkranz. Dammriß II. Gr.
118. 09/10. Kl. 799	25 27 18,5 c. d. 11	—	I. Schl.	—	16½ Placenta praevia total. Part. praemat. mens. IX. Seit 10 Tag. Blutung	o. B.	M. tot, 1900, L. 45,5, K. U. 31, Sch. U. 31	Hyster- euryse. Wendung	Mutter: klein. Nach Einlegen des Ballons keine Herztöne mehr

Leide. No. Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becker- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
119. 10/11. Kl. 627	27	II. p. Infolge Unfalls im 5. Jahre gekrümmt Rücken. Mit 25 Jahren Cholelithiasis. I. part. spontan	24,5 17 c. d. 11	Pro- mont. stark vor- spring.	I. Schl.	—	17½	Hinter- scheitel- bein- einstellg.	o. B.	K. lebt, 3550, L. 51, K. U. 35, Sch. U. 36, Gr. D. 9½, Gr. schr. 13, Kl. sehr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5	Narkose, Wendung. Credé. Cervix- u Damm- naht	Mutter: klein. starke Kyphoskol. Atonia uteri. Cervixnäf. Dammriß II. Gr. Kind: asphyktisch

b) Wendung aus Querlage.

120. 08/09. Pol. 912	43	VIII. p. 6 part. spont., lange dau- ernd; 1 mit Kunsthilfe	c. d. 10,5—11	—	I. Dorso- anteriore Querlage	—	—	—	—	K. tot, 5000	Wendung	Mutter: Hängebauch. Kind: groß, asphyk- tisch, schw. Atmung, starb nach 15 Min.
121. 08/09. Kl. 276	33	V. p. I. part. Totgeb. II. u. III. part. spontan, Kinder leben. IV. part. Totgeb.	sp. i. 25 cr. i. 28 c. d. 11	—	I. Dorso- anteriore Querlage	vor- zeitig	78½	—	1.—4. Tag 38,6—38,9 Abdomen stark druck- empfindlich	K. tot, 1870, L. 46, K. U. 28½, Sch. U. 28	Narkose, Wendung, Perforat. des nach- folg. Kopf.	—
122. 08/09. Kl. 376	28	V. p. Als Kind böse Augen u. böser Kopf. 4 part. spont., Kinder sehr schwach	27 18,5 c. d. 11,5 c. d. 10 c. v. 8,5 B. E. 10 B. M. 12 B. A. 10	Dep- peltes Pro- mont. stark	II. Dorso- anteriore Querlage	—	12	—	5. Tag 38,0, 9. Tag 37,5. Abdomen empfind- lich	M. lebt, 3970, L. 54, K. U. 34,5, Sch. U. 33, Gr. D. 12, Gr. schr. 13, Kl. sehr. 10, Gr. qu. 9½, Kl. qu. 8½	Narkose, Wendung	Kind: asphyktisch, Fraktur des linken Humerus u. rechten (Oberschenkels)
123. 09/10. Kl. 147	31	V. p. I. part. spontan. II. part. Stojil. Perforation des nachfolgenden Kopfes. III. part. Stojil.	24 18 11 c. v. 9 B. E. 11,5 B. M. 11,5	Pro- mont. stark vor- spring.	II. Quer- lage	—	4½	Keine Herz- töne. Seit ca. 8 Std. keine Kinds- bewegung. gemerkt	o. B.	K. tot, 3610, L. 52, K. U. 36, Sch. U. 38, Gr. D. 12, Gr. schr. 13, Kl. sehr. 10,	Narkose, Wendung	Mutter: klein

Pol. 1050	125. 09/10. 32	Pol. 36	126. 10/11. 39	Pol. 450	127. 10/11. 32	Pol. 720	128. 09/10. 22	Kl. 793	129. 09/10. 19	Pol. 555
arthrit. Rheum.	10, 9 11, 9	c. v. 9	c. v. 9	c. v. 11	c. d. 11	c. d. 11	c. d. 10 $\frac{1}{2}$	c. v. 8 $\frac{3}{4}$	c. d. 11, 5	
I. part. spontan.								B. E. 11		
II. part. spontan.								B. M. 9 $\frac{1}{2}$		
kurze Dauer.								B. A. 8 $\frac{1}{2}$		
Kinder leben										

Extraktion.

125. 09/10. 32	Pol. 36	VII. p. 6 part. spont.	c. d. 11	I. Steißf.	vor- zeitig	—	—	—	M. lebt, L. 54	Herabholen des linken Fusses, Arm- lösung, Veit- Smellie. Credé	Atonia uteri. Kind: leicht asphyktisch
126. 10/11. 39	Pol. 450	VII. p 6 part spont.	c. d. 11	I. Steißf.	—	—	—	—	M. lebt, 3250, L. 50	Herabholen eines Fusses Extraktion	—
127. 10/11. 32	Pol. 720	VI. p. I. part. spontan. II. part. Perforat. d. nachfolgend. Kopfes. III. u. IV. part. Perforation. V. part. Quel- totes Kind	24 26,5 18 c. d. 10,5	I. Fußf.	—	9 $\frac{3}{4}$	—	—	M. lebt, 3900, L. 51 $\frac{1}{2}$	Arm- lösung, Veit- Smellie	Mutter: klein. Kind: asphyktisch, Druckmarke auf der rechten Schläfe
128. 09/10. 22	Kl. 793	II. p. I. part. Nabel- schnur- vorfall	c. d. 10 $\frac{1}{2}$ c. v. 8 $\frac{3}{4}$ B. E. 11 B. M. 9 $\frac{1}{2}$ B. A. 8 $\frac{1}{2}$	II. Steißf.	—	14	Steiß etwas nach rechts ab- gewichen. Recht. Arm vor- gefallen	o. B.	M. lebt, 2700, L. 51, K. U. 34, Sch. U. 37, Gr. D. 11, Gr. schr. 12 $\frac{3}{4}$, Kl. schr. 10 $\frac{1}{4}$, Gr. qu. 10, Kl. qu. 9	Reposition des vor- gefallenen Armes, Arm- lösung, Veit- Smellie. Dammnäh	Mutter: klein. Dammriß II. Gr. Kind: absichtlicher Bruch der rechten Humerusdiaphyse, tief asphyktisch

Perforation.

129. 09/10. 19	Pol. 555	II. p. I. p. Spontan- geburt	c. d. 11, 5	II. Schl.	vor- zeitig	—	Nabel- schnur- vorfall	—	K. tot	Ferforat., Cranio- elast	Repositions- und Wendungsversuch mißlingt. Keine Herzöne
----------------	----------	------------------------------------	-------------	-----------	----------------	---	------------------------------	---	--------	--------------------------------	---

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
130. 09/10. Pol. 667	31	III. p. Rhachitis. 2 Aborte	c. d. 11	—	I. Schl.	—	—	keine Herztöne mehr	—	K. tot	Narkose, Perforat., Cranio- clast	Mutter: rhachitischer Rosenkranz, stark sichelartige Tibiae. Nach vergeblichem hohen Zangenversuch Herztöne nicht mehr zu hören
131. 10/11. Pol. 782	22	II. p. I. part. spont.	c. d. 10,5	—	I. Querl. ver- schleppt	—	—	Partus praem- muns, VIII. Nabel- schnur- vorfall, Kind †	—	M. tot, L. 39	Rhachio- tomie, Perforat., Extrakt.	Mutter: klein. Wendungsversuch mißlingt
132. 10/11. KI. 1135	41	IV. p. I. part. spont., Kind nach 24 Stunden †. II. u. III. part. Perforation	26 29½ 18 10 c. v. 8½ B. E. 11 B. M. 10 B. A. 8	—	I. Stirnl.	—	35½	Nabel- schnur- vorfall. Kind stirbt intra part. ab. Mekonium	1.—16. Tag, T. bis 39,6	K. tot, 3000, L. 50	Narkose, Perforat., Cranio- clast	—
Settlo classica.												
133. 08/09. KI. 413 Gyn. 467	35	VI. p. 1 Kind lebt (Sektio), alle andern perforiert oder embryo- tomiert	26 30 16½ 9½ c. v. 9. B. E. 10 B. M. 10 B. A. 9	—	II. Schl.	—	—	Kopf nach links ab- gewichen	Bronchitis 2. Tag T. 38,2, Puls 120. 3. Tag T. 37,5, Puls 100, 4. Tag 37,9	M. lebt, 2680, L. 48, K. U. 37, Sch. U. 33, Gr. D. 11½, Gr. schr. 12½, Kl. schr. 9½, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	Sectio caesarea classica, Sterilisat.	Schnitt in der alten Narbe, Uterus am Peri- tonium partielle ad- haerent, Beidseitige Tubovexzision. Entlassungsbedin- gung: Narbe, mump- fürlich, 13 cm lang, Uterus anteflektiert, mäßig mobil. Adhäsionspfle o. B.
Settlo transperitonealis.												
134. 08/09	25	V. p.	c. d. 10,5	—	I. Schl.	vor-	—	Partus praen.	3. Tag	K. lebt. 2030.	Sectio	Mutter: Tibiae, en-

135. 10/11. Kl. 70. Gyn. 49	27	IV. p. Epilepsie. 3 part. spont.	c. d. 11 c. v. 9	—	I. Schl.	—	39 $\frac{3}{4}$	her gerade bis zur Sagittal- linie vor-prängt, weich und fluktu- ierend zu scheint, und sich aufhört, als ob er von d. Adhären- z ausgehe. Nicht dislozibel	3. Tag T. 38 S. Puls 128. 5. Tag Naht völlig auf- gegangen, große Abszeß- höhle	K. lebt, 3720, L. 53, K. U. 37, Sch. U. 40, (ir. D. 12, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 10 $\frac{1}{4}$, Kl. qu. 8 $\frac{1}{4}$	Sectio cervicalis transperi- tonealis	Kind: sehr groß, Kopf, asphykt. Operations- bericht: extraperitoneal zu bleiben, nißlingt. Sektionsbefund: Därme stark gebläht, Ober- fläche matt. Auf der Uterusserosa, besond. in d. Gegend der Inzision fibrin. Auflagerungen. Kein Pus in der Bauch- höhle, nur wenig trübes Exsudat. Viel Decidua im Uterus, aber gut aussehend. Milz groß, weich
136. 10/11. Kl. 1066. 11/12. Gyn. 18	34	II. p. Vater an The. 3. Mit 1 $\frac{1}{2}$ Jahren hatten Gelenk. Typhus abdominalis, Chorea minor. Mit 20 J. Poly- arthritis rheum. u. Endocarditis. Vor 2 Jahren Sectio extra- peritonealis (Fall 33)	23 27 17 $\frac{1}{2}$ 10 $\frac{1}{2}$ c. v. 8,5 B. E. 11 B. M. 10 B. A. 6	—	I. Schl.	—	8	dieselbe Indikation wie vor 2 Jahren (cf Fall 33)	I.—4. Tag 38,8—38,8. Puls 100 bis 132. Pneu- monie. Vor 5. Tg. T. unter 38,0	M. lebt, 3140, L. 51, K. U. 35, Sch. U. 37, Gr. D. 11, Gr. schr. 13, Kl. schr. 9 $\frac{1}{2}$, Gr. qu. 8, Kl. qu. 7	Sectio cervicalis transperi- tonealis	Kind: großer Kopf

Life. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
 Sectio extraperitonealis.												
137. 10/11.	24	IV. p. Vater an Lungenleiden v. Phthisis. mit 4 Jahren lauten gelernt. 2 part. spontan. III. part. Abort	24 26 16½ c. d. 10,5	dep- peltos Pro. monitor.	I. Schl.	—	40	Unter- scheid- bein- einstellung. Kopf nach links ab- gewichen. Kontrak- tionsring	1.—3. Tag 37,6—38,4 P. 84—120. Dann unter 38,0. Wunde weicht völlig aus- einander	K. lebt, 3570, L. 53, K. U. 36, Sch. U. 36,5, Gr. D. 12. Gr. schr. 13½, Kl. schr. 11½, Gr. qu. 9½, Kl. qu. 8½	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Mutter: klein, deutlich. Rhachitiszeit hen. Kind: sehr großer Kopf. Wahrscheinl. Hänge- lage, ohne Erfolg. Entlassungsbefund: 5 cm lange, 9 cm breite, granulierende Wunde. Uterus antelektiert
138. 09/10 Kl. 509 Gyn. 149	29	II p. I p. Wendung. Perforation des nachfolg Kopfes	26 28 17 9,5-10 c v. 8½-9 B. E. 10½ B. M. 10½ B. A. 8½	allgem. ver- engt. Pro- monitor. stark Vor- spring.	II. Schl.	—	—	Vorder- scheid- bein- einstellung	1. Tag. T. 38,3. Puls 100. 2.—3. Tag T. unter 38,0. 4.—11. Tag T. 38,0—38,6. Puls um 108	K. lebt, 3560. L. 51, K. U. 36½, Sch. U. 38, Gr. D. 12. Gr. schr. 13½, Kl. schr. 10½, Gr. qu. 9½, Kl. qu. 8	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Kind: recht groß. Entlassungsbefund: Bauchnarbe fest, Uterus antelektiert, an der Bauchwand adhärent
139. 09/10. Kl. 512. Gyn. 158	31	III. p. Spät. laufen gelernt. II. part. Per- foration. Will lebendes Kind	24 25 18 c. d. 11	—	I. Schl.	vor- zeitig	10½	Vorder- scheid- bein- einstellung. Mekonium abgange. Kontrak- tionsring. Herztöne 100—120	1. Tag 37,8. 2.—6. Tag T. 37,6 bis 38,1. P. 92—108	K. lebt, 3350. L. 54, K. U. 36½, Sch. U. 40, Gr. D. 12½. Gr. schr. 13½, Kl. schr. 11, Gr. qu. 10½, Kl. qu. 9.	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Mutter: klein. Kind: bleich, asphyktisch
140. 10/11 Kl. 945. Gyn. 754	26	III. p. Mit 2 Jahren lauf. gelernt. I. part.	24 26 19 11 c. v. 9 B. E. 11	—	I. Schl.	vor- zeitig	42½	Kopf trifft nicht ein	4. Tag 37,8	M. lebt, 3490, L. 53, K. U. 36, Sch. U. 40, Gr. D. 11. Gr. schr. 13½, Kl. schr. 10½	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Mutter: klein, rhachit. Rosenkranz. Wahrschein- liche Hängelage ohne Erfolg.

141. 10/11. Kl. 1043. Gyn. 795	21	II. p. I. part. spont., Kind lebt	24 27 17½ c. d. 10,5	—	I. Schl.	—	14½	Kopf stark auf die linke Darmbein- schaufel ab- gewichen. Herztöne 170 180	1.—4. Tag T. 37,8 bis 38,3, P. 120-140. 5. u. 6. Tag 38,0, Puls 124 u. 116	M. lebt, 3300, L. 52, K. U. 36, Sch. U. 36½, Gr. D. 11½, Gr. schr. 13½, Kl. schr. 10½, Gr. qu. 10½, Kl. qu. 9½	Sectio cervicalis, extraperi- tonealis	uterus retrovertiert, graun- atonschleimig. Uterus retroflektiert, -vertiert. Cervix an der Bauch- narbe adhärent. Keine Beschwerden. Mutter: klein, grazil. Kind: Kopfgeschwulst. Entlassungsbefund: keine Beschwerden, gut verheilte Operations- narbe, unten breit, über- all epithelialisiert, fest. Uterus retrovertiert. -flektiert. Cervix an der Bauchnarbe adhärent
142. 10/11. Kl. 1052. 11/12. Gyn. 16	39	XI. p. Rhachitis, mit 5 J. laut. gelbm. I. part. Zange, II. Kind lebt. III. p. Perforat. spontan, Kinder leben. V. part. Extrakt. Kind mit 2 J. + VI. part. spont. Kind m. 7 Mon. + VII. part. Kunst- hilfe, Kind +. VIII. p. Perforat. IX. u. X. part. Wendung, I. Kind lebt, 2, +	25¼ 27½ 18 c. d. 10,5	—	II. Schl.	—	30½	Unter- scheidel- bein- einstellg., Kopf nach links ab- gewichen. Herztöne 160	2.—6. Tag T. 37,2 bis 37,7, P. 68—96	K. lebt, 3000, L. 51, K. U. 35, Sch. U. 36, Gr. D. 11½, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 9	Sectio cervicalis, extraperi- tonealis	Mutter: klein, genu valgum. Kind: große Kopf- geschwulst. Entlassungsbefund: Drainierter Wunden- teil unten noch granulierend. Uterus anteflektiert, anscheinend an den Bauchdecken adhärent

Zwillinge.

143. 08/09. Kl. 235	33	III. p. 2 normale part.	c. d. 10 c. v. 8¼ B. E. 11 B. M. 11 B. A. 9½	—	a) I. Schl. b) II. Schl.	—	25	—	—	2 K. leben, a) 2430, L. 47, K. U. 34, Sch. U. 33, Gr. D. 11¼, Gr. schr. 12¼, Kl. schr. 10, Gr. qu. 8¼, Kl. qu. 7½, b) 1970, L. 46, K. U. 32½, Sch. U. 29, Gr. D. 10¼, Gr. schr. 11¼, Kl. schr. 9¼, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8½	—	uterus retrovertiert, graun- atonschleimig. Uterus retroflektiert, -vertiert. Cervix an der Bauch- narbe adhärent. Keine Beschwerden. Mutter: klein, grazil. Kind: Kopfgeschwulst. Entlassungsbefund: keine Beschwerden, gut verheilte Operations- narbe, unten breit, über- all epithelialisiert, fest. Uterus retrovertiert. -flektiert. Cervix an der Bauchnarbe adhärent
------------------------	----	-------------------------------	--	---	-----------------------------	---	----	---	---	--	---	---

Vera 8,4—7,5.

Lebte. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	(Geburts- dauer)	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
-------------------------------------	-------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------	-------------------------------	-------------

I. Erstgebärende.

Spontangeburt.

144. 08/09. Kl. 222	28	I. p. Rhachitis	21 25 17 c. d. 10	—	I. Schl.	—	26 $\frac{3}{4}$	Me- konium- abgang, schlechte Herztöne	o. B.	K. lebt, 3250, L. 50, K. U. 37, Sch. U. 39, Gr. D. 12 $\frac{1}{2}$, Gr. schr. 14 $\frac{1}{2}$, Kl. schr. 11, Gr. qu. 9 $\frac{1}{2}$, Kl. qu. 9	Cristeller Crédé	Atonia uteri. Kind: starke Kopfgeschw., rechtsseitig. Fazialis- parese, r. Scheitelbein leicht imprimiert. Spontangeburt
145. 08/09. Kl. 352	37	I. p.	28 30 $\frac{1}{2}$ 20 c. d. 10	platt	II. Schl.	—	15 $\frac{1}{2}$	—	3.—8. Tag riechende Lochien	M. lebt, 3380, L. 50,5, K. U. 37,5, Sch. U. 35,5, Gr. D. 12, Gr. schr. 15, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9 $\frac{1}{2}$, Kl. qu. 8	—	Spontangeburt. Kind: hochgradige Kopfgeschwulst, leicht asphyktisch, am r. Scheitelbein je eine 3 cm und 1 cm lange Druckmarke
146. 09/10 Kl. 96	18	I. p. Rhachitis, mit 2 Jahren lauf. gelernt. Mit 12 Jahren Krämpfe	25,5 26 17 c. d. 10	—	I. Schl.	—	31	—	o. B.	M. lebt, 2550, L. 49, K. U. 32,5, Sch. U. 34, Gr. D. 10 $\frac{3}{4}$, Gr. schr. 12 $\frac{1}{2}$, Kl. schr. 9 $\frac{1}{4}$, Gr. qu. 8 $\frac{1}{2}$, Kl. qu. 7 $\frac{1}{2}$	Walcher- sche Hänge- lage	Spontangeburt. Mutter: klein. Kind: 2 Tage p. part. Krämpfe. Exitus. Großes subdurales Hämatom
147. 09/10. Kl. 265	23	I. p. Rhachitis	26 27 16 $\frac{1}{2}$ 10 $\frac{1}{4}$ c. v. 8 B. F. 10 $\frac{1}{4}$	—	I. Schl.	—	11 $\frac{1}{2}$	Me- konium im Frucht-	o. B.	M. lebt, 3470, L. 53, K. U. 34, Sch. U. 39, Gr. D. 12, Gr. qu. 11 $\frac{1}{4}$, Kl. qu. 11 $\frac{1}{4}$	—	Spontangeburt. Mutter: Säbel- scheidentibiae.

148. 10/11. 28 Kl. 128	I. p. Mit 2 Jahren laufen gelernt	23 17 c. d. 10	—	I. Schl.	—	10 Tg.	Hinter- scheitel- bein- einstellg., schlechte Herztöne	7.-11. Tag riechende Lochien. 8. Tag links deutliche Resistenz. 8.-17. Tag T. 38,2-40,7. Alb. 3 1/2 %	K. tot, 2450, L. 52, K. U. 36	Kind: sehr starke Kopfgeschwulst, schwer asphyktisch, trotz guten Herz- schlages nach 1 Stunde †
---------------------------	---	----------------------	---	----------	---	-----------	---	---	-------------------------------------	---

Hohe Zange.

149. 08/09. 27 Kl. 128	I. p. Mit 1 Jahre laufen gelernt	sp. i. 25 cr. i. 27 1/2 c. d. 10	—	II. Schl.	—	110 3/4	Vorder- scheitel- bein- einstellg. Fehrl. intra part. 1 Tag a part. 38,8, am 1. g. d. part 38,0. Herztöne 190	3.-8. Tag T. bis 38,2, dann zwischen 37,5 u 38,0. 8.-17. Tag Riechende Lochien	M. lebt, 3400, L. 54, K. U. 37, Sch. U. 39, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10 1/2, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	Mutter: mutter- munds- inzision, hoh. Zang, Mutter- munds- u. Damm- naht Mutter: Spitzbauch, Dammriß II. Gr. Kind: starke Kopf- geschwulst, schwer asphyktisch, am nächst. Tage Exitus
---------------------------	--	--	---	-----------	---	---------	---	---	--	--

Wendung.

150. 08/09. 27 Pol. 23	I. p.	c. d. 9-9,5,	—	I. Dorso- antere Querlage	—	—	Arm- vorfall	—	K. tot	Kopf geht nicht durchs Becken
---------------------------	-------	--------------	---	---------------------------------	---	---	-----------------	---	--------	----------------------------------

Perforation.

151. 09/10. 21 Pol. 291	I. p.	c. d. 10	—	I. Schl.	—	—	Kind schon tot. Mekonium im Frucht- wasser	—	K. tot	—
152. 08/09. 26 Kl. 53	I. p. Mit 4 Jahren laufen gelernt	21,5 24 16 c. d. 10	—	I. Schl.	—	49	Stinkendes Frucht- wasser. Kind †. Temp. 37,8. Alb. 20% Dehnungs- erscheing.	1. Tag 38,0, 3. Tag 37,9, 4. Tag 37,5	M. tot, 2850, L. 49	Kind: große Kopf- geschwulst

Leite. No. Jahrgang. Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- spannung	(Geburts- dauer)	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
 Sectio cervicalis transperitonealis.												
153. 09/10. 24 Kl. 386. Gyn. 385		I. p. Rhachitis, seit Kindheit augenkrank	23 26 20 9 c. v. 7½-8	all- ge- mein ver- engt	II. Schl.	—	6½	Kopfnach rechts ab- gewichen	o. B.	M. lebt, 2600, L. 47, K. U. 35, Sch. U. 35, Gr. D. 11, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 10, Kl. qu. 9	Sectio cervicalis transperi- tonealis	Mutter: rhachitisch. Habitus. Kind: bleich asphyk- tisch. Entlassungs- befund: Narbelinear. Uterus anteflektiert. Keine Klagen
 Sectio cervicalis extraperitonealis.												
154. 09/10. 29 Kl. 517. Gyn. 487		I. p. Mit 1½ Jahren lauf. gelernt. Will lebendes Kind	26 27 17 c. d. 10	—	II. Schl.	—	33½	Hinter- scheid- bein- einstellung. Dauer- kontrakt. Herzföne 100	5. Tag rechte Mamma infiltriert. Kein Fieber	M. lebt, 3048, L. 48, K. U. 36, Sch. U. 37, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 11, Gr. qu. 9½, Kl. qu. 9	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Mutter: klein. Kind: große Kopf- geschwulst. Entlassungsbefund: Bauchwunde bis auf erbsengroße Granu- lationpprim. geheilt
155. 10/11 25 Kl. 808. Gyn. 723		I. p. Mit 1½ Jahren laufen gelernt.	24 26 20 c. d. 9,5	Pro- mont. sehr stark vor- spring.	I. Schl.	—	10½	Hinter- scheid- bein- einstellg. Kontrak- tionsring	2. u. 3. Tag 38,0, 14 T. 39,0. Sch. Mastitis	K. lebt, 2740, L. 50, K. U. 36½, Sch. U. 32½, Gr. D. 11, Gr. schr. 13, Kl. schr. 9, Gr. qu. 10½, Kl. qu. 7	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Mutter: klein, grazil. Kind: großer, harter Kopf, mäßige Asphyxie massenhafte Mekonium an der Plazenta, Entlassungsbefund: primäre Wundheilung

II. Mehrggebärende.

Spontangeburt.

156. 08/09. 30 Kl. 974	III. p.	c. d. 10	—	II. Schl.	—	14	rechter	K. lebt	Wundheilung
---------------------------	---------	----------	---	-----------	---	----	---------	---------	-------------

I. u. L.	I. part. totes Kind.	II. part. Perforation	I. Schl.	II. Schl.	Hinter-scheitel-bein-einstellg.	L. 50	gekrümmt Kind: starke Kopfgeschwulst
158. 08.09. Kl. 336	24	II. p. Rhachitis, mit 3 Jahren lauf. gelenkt. I. part. spont., Kind lebt	20 24 16,5 c. d. 10	—	—	27 $\frac{1}{2}$	o. B. K. lebt, 3430, L. 52, K. U. 38, Sch. U. 39, Gr. D. 12 $\frac{1}{2}$, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10 $\frac{1}{4}$, Gr. qu. 9 $\frac{3}{4}$, Kl. qu. 8 $\frac{1}{2}$
159. 08.09. Kl. 556	21	III. p. 2 part. spont.	23 24 $\frac{1}{2}$ 18 9 $\frac{1}{2}$ c. v. 8 $\frac{1}{4}$ B. E. 12 B. M. 11 B. A. 10	—	—	15 $\frac{1}{2}$	o. B. K. lebt, 3240, L. 49 $\frac{1}{2}$, K. U. 35 $\frac{1}{2}$, Sch. U. 37, Gr. D. 12, Gr. schr. 13 $\frac{1}{2}$, Kl. schr. 9 $\frac{1}{2}$, Gr. qu. 9 Kl. qu. 8
160. 09.10 Kl. 9	21	II. p. Mutt. a. Tbc. † I. part. spont. Frühgeburt im 7. Monat	c. d. 10	—	13	—	o. B. K. lebt, 3570, L. 52, K. U. 39, Sch. U. 40, Gr. D. 13, Gr. schr. 15 $\frac{1}{2}$, Kl. schr. 11, Gr. qu. 10, Kl. qu. 9 $\frac{1}{4}$
161. 09.10. Kl. 677	34	III. p. Viel augenkr. I. part. spontan. schwer. II. part. Fußlage, Extraktion	25 29 17 $\frac{1}{2}$ 9 $\frac{1}{4}$ c. v. 8	Pro- mont. tief- steh- end	—	6 $\frac{1}{4}$	o. B. K. lebt, 3720, L. 53, K. U. 37 $\frac{1}{2}$, Sch. U. 41, Gr. D. 12, Gr. schr. 14 $\frac{1}{2}$, Kl. schr. 11, Gr. qu. 10, Kl. qu. 9 $\frac{1}{2}$
162. 10.11. Kl. 852	30	IV. p. Rhachitis, spät laufen gelenkt. I. — III. part. künstl. Früh- geburt i. 7. Mon. 1. Kind totgeb. 2. Kind 2 T. alt †. 3. Kind vor Ein- leitz. schon tot	27 29 17 9 $\frac{3}{4}$ c. v. 8 $\frac{1}{4}$ B. E. 10 B. M. 10 B. A. 7	—	—	5 $\frac{3}{4}$	o. B. K. lebt, 3230, L. 52, K. U. 35 $\frac{1}{2}$, Sch. U. 37, Gr. D. 12, Gr. schr. 14, Kl. schr. 10, Gr. qu. 8 $\frac{1}{2}$, Kl. qu. 7 $\frac{1}{2}$

Titel, No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilf- leistung	Bemerkungen
163. 10/11. Kl. 921	33	VII. p. Vateru. m. paar Geschw. a. Die f. Rhachitis. I. part. Embryo- tomie. II. und III. part. künstl. Früh- geburt. IV. und V. part. spontan. VI. p. Wendung	25 25 15 c. d. 9 $\frac{3}{4}$	—	II. Schl.	vor- zeitig	41 $\frac{1}{4}$	Part. praemat. mens. VII	o. B.	M. lebt, 1020, L. 38, K. U. 25, Sch. U. 24, Gr. D. 8, Gr. schr. 10, Kl. schr. 7, Gr. qu. 6, Kl. qu. 5 $\frac{1}{2}$	—	Mutter: klein, grazil. Spontangeburt. Kind am 2. Tage +
Zange.												
164. 10/11. Pol. 25	20	II. p. I. part. spont.	c. d. 9,5	—	I. Schl.	—	—	wechschende Herztöne, Mekonium- abgang	—	K. lebt	Narkose, Episiotom., Zange, Crédé, Dammnäh	Mutter: Dammriß II. Gr. Atonia uteri. Kind: groß, asphykt., große Kopfgeschw.
165. 08/09. Kl. 35	24	II. p. Mit 4 $\frac{1}{2}$ Jahren lauf. gelernt. I. part. Zange	22 25 $\frac{1}{2}$ 16 c. d. 10	—	I. Schl.	—	42 $\frac{1}{2}$	Mekonium- abgang, Kindliche Herztöne 60—80	1. Tag 37,5 K. lebt, 2500, L. 49, K. U. 34, Sch. U. 34, Gr. D. 11 $\frac{1}{2}$, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9 $\frac{1}{2}$, Kl. qu. 8 $\frac{1}{4}$		Zange, Scheiden- näh	Mutter: Scheidenriß. Kind: asphyktisch
Wendung.												
a) Aus Kopfage.												
166. 08/09. Pol. 840	27	II. p. I. part. hohe Zange	c. d. 10	platt	I. Schl.	—	—	Hinter- scheitel- bein- einstellung	—	M. lebt	Narkose, Wendung, Scheiden- näh	Mutter: kleiner Scheidenriß. Kind: asphyktisch
167. 09/10. Pol. 287	28	IV. p. Rhachitis. I. part. spont.	24 26 17 c. d. 9,5	—	I. Schl.	—	—	Hinter- scheitel- bein- einstellung	—	K. lebt	Wendung, Crédé	Mutter: schwächlich. Atonia uteri

Pol.	379	3mal Wöndung, 2 Kinder †, 1 mal Perforat. 1 mal spontan. Frühgeburt, Kind †	c. d. 10	—	I. Schl.	—	ca. 53	—	M. lebt	Wendung	Atma uteri
169. 09/10. Pol. 624	32	XII. p. 1 Fehlgeburt, 1 part. spontan, 4 mal Zange, 1 mal Steißlage, 1 mal Wöndung	26 16½ c. d. 10	—	II. Schl.	—	8½	Nabel- schnur- vorfall	M. tot, 3400, L. 56, K. U. 35,	Narkose, Wendung	Mutter: Kypho- skolose. Kind: Wieder- liebung gelingt nicht
170. 10/11. Pol. 129	35	V. p. I. part. Kranio- tomie, 1 part. Zange	26 28,5 16½ c. d. 10	—	II. Schl.	—	14½	Nabel- schnur- vorfall, schlechte Herztöne	K. tot, L. 50, K. U. 33	Narkose, Wendung	Reposition der Nabelschnur gelingt nicht
171. 10/11. Pol. 143	29	III. p. I. part. hohe Zange, Kind †, II. part. Nabel- schnurvorfal, Wöndung, Kind †	35 27 15½ c. d. 10	—	I. Schl.	—	19½	Hinter- scheitel- bein- einstellung, Mekonium- abgang	K. lebt, 3600, L. 52, K. U. 36½	Hyster- euryse, Wendung	Mutter: klein, gekrümmte Tibiae, Hängebauch. Kind: starke Kopf- geschwulst, schwer asphyktisch, Klavikelfraktur, rechts
172. 10/11. Pol. 727	29	VII. p. Rhachitis. I. part. spontan, II. part. Zange, III. part. Totgeb. IV.-VI. part. spontan	sp. i. 21½ cr. i. 24 c. d. 10,4	—	II. Schl.	—	3	Nabel- schnur- vorfall, recht. Arm vorgefall. Kopf a. die l. Becken- schaufel abgewichen	K. tot, 3850, L. 37, K. U. 36	Narkose, Wendung Perforat. des nach- folgenden Kopfes, Damm- naht	Kopf geht nicht ins Becken. Zu anderer Operation keine Zeit, weil der Kopf in den Wehen die Nabelschnur zusammendrückt. Mutter: Dammrig II. Gr. Kind: tiefe Impression auf dem rechten Scheitelbein
173. 09/10. Kl. 500	26	II. p. Rhachitis, mit 4 Jahren lauf. gelernt. I. p. Forzepts. Kind †	c. d. 9,5 c. v. 7,5 B. E. 12 B. M. 10 B. A. 9	—	I. Schl.	—	3	Nabel- schnur- vorfall, recht. Arm vorgefall. Kopf a. die l. Becken- schaufel abgewichen	K. tot, 3850, L. 37, K. U. 36	Narkose, Wendung Perforat. des nach- folgenden Kopfes, Damm- naht	Kopf geht nicht ins Becken. Zu anderer Operation keine Zeit, weil der Kopf in den Wehen die Nabelschnur zusammendrückt. Mutter: Dammrig II. Gr. Kind: tiefe Impression auf dem rechten Scheitelbein

Life. No. Jahrgang. Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	(geburt- dauer)	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
174. 08/09. Pol. 433	36	X. p. 2 Abort. VII. u. VIII. part. Wendung: Kinder f. IX. p. Perforat.	c. d. 10	—	II. Dorso- antere Querlage	—	—	—	—	M. tot, K. U. 38	Narkose, Wendung, Credé	Mutt.: Oberschenkel Wendung, gekrümmt. Hänge- bauch, Atonia uteri. Extraktion sehr schwer
175. 09/10. Pol. 719	35	VI. p.	27 29 17 c. d. 10	—	II. Dorso- antere Querlage	—	15½	—	—	K. lebt, 3000, L. 47½, K. U. 33	Narkose, Wendung	Mutter: Struma, Exophthalmus
176. 09/10. Pol. 755	27	II. p.	c. d. 10	—	II. Dorso- antere Querlage	—	37½	vorzeitige Lösung der Plazenta. linker Arm Vorgefall. Herztöne wechselnd	—	K. tot, L. 51, K. U. 33	Narkose, Wendung	2 Tage vor W. ehenbeginn etwas Blutung, bei jeder Wehe starker Blut- abgang. 1 Segment Plazenta liegt vor Kind. rechte Klavikula frakturiert
177. 09/10. Kl. 696	23	II. p. Rhachitis. I. part. spont.	23½ 25½ 18,5 c. d. 10	—	I. Dorso- antere Querlage	—	3½	Extraktion auf der Symphyse Nicht, weil das Kind auf der Perforation dabei Perforation	o. B.	M. tot, 3150, L. 51, K. U. 34 nach der Perforation	Narkose, Wendung, Perforat. des nach- folgenden Kopfes	Kind: tiefe Im- pression auf dem rechten Scheitelbein

b) Aus Querlage.

Extraktion.

178. 09/10. Pol. 254	26	IX. p. 8 part. spont. 3 Kind. leben. 17 nach 2 Std.	c. d. 9-9,5 c. v. 8	p' att	I. Fußl.	—	—	schlechte Herztöne	—	K. lebt	Extrakt.	Kind: atmetschwach spontan, stirbt nach 10 Minuten Klavikula
-------------------------	----	--	------------------------	--------	----------	---	---	-----------------------	---	---------	----------	--

Pol.	31	324	34	454
180. 09/10.	31	Pol. 324	181. 10/11.	34
Pol. 324			Pol. 454	
3 part. spontan. 1 mal Zange, 4 mal Zwillinge. Alle Kind. leben. 4 Aborte				
V. p. I. und II. part. spontan. II. Kind +. III. p. part. Perforat. IV. part. kindst- liche. Frühgeb. Hemosteatomie. Kind lebt				
c. d. 10				
I. Steißl.				
—				
vor- zeitig				
—				
Herztöne				
—				
M. tot				
—				
Extrakt. Perforat. des nach- folgenden Kopfes, Damm- naht				
Dammriß II. Gr.				
—				
Herunter- schlagen des vord. Fufes, Extrakt.				
—				

Perforation.

Pol.	25	650	29	652
182. 08/09.	25	Kl. 650	183. 08/09.	29
Kl. 650			Kl. 652	
IV. p. Vater an The. +. Mutter lange lungenkrank +. Rhachitis. Skrophulose. Mit 3 Jahren laufen gelernt. I. u. III. p. spont. Kinder leben. II. part. Quer- lage, Kind +.				
c. d. 10⁴				
I. Schl.				
—				
14¹/₂ Nabel- schnur- vorfall, pulsirt nicht mehr. Kopf nach links ab- gewichen				
o. B.				
K. tot, 2550. L 50				
Narkose, Perforat., Cranio- clast				
Mutter: rhachitisch. Rosenkranz. Krumme Unterarme und Unterschenkel				
—				
2 Std. p. part. Schüttel- rost. 2. Tag 39.1. 3. Tag 38.3. Lochial- Tympania uteri. sekretdult. Febris intra part. 38.2				
K. tot, 2180, L 51				
Perforat., Cranio- clast				
Mutter: klein, rhachitische Ver- änderungen am Thorax				

Life. No. Jahrgang- Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Gefähr- dung (Geburt) Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
-----------------------------------	-------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------	---------	-------------------------------	-------------

Sectio caesarea classica.

184. 08/09. Kl. 133. Gyn. 128	27	V. p. Mit 4 Jahren laufen gelernt. I. part. Perforat. II. part. Steif- geburt. III. part. künstl. Frühgeburt im 6. Monat. IV. part. Abort.	26 26½ 15½ 9 c. v. 8 B. E. 11 B. M. 10½ B. A. 10	—	II. Schl.	—	—	Kopf nach links ab- gewichen	2 mal; T. 37,8	M. lebt, 3080	Sectio caesarea classica	Mutter: 138 cm groß. Kind: leicht asphykt. Entlassungsbefund: Narbe o. B. Uterus anteflektiert. Kind gedeiht. Keine Beschwerden
-------------------------------------	----	---	---	---	-----------	---	---	------------------------------------	-------------------	---------------	--------------------------------	---

Sectio cervicalis transperitonealis.

185. 09/10. Kl. 888 Gyn. 834	27	II. p. Eltern an Tbc. f. Rhachitis, mit 6 Jahren lauf gelernt I. part. Kaiser- schnitt	24 25 15 8,5 c. v. 7,5 bis 7¾	dopp. Pro- mont.	I. Schl.	—	15½	—	1. Tag 38,0, 4. Tag 38,2, bis 12. Tag Sch. U. 39, Gr. D. 11,5, subfebrile Tempe- raturen	M. lebt, 3740, L. 51, K. U. 35, Gr. schr. 13, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	Sectio cervicalis transperi- tonealis Salpinge- ectomie	Kind: groß, asphykt. Entlassungsbefund: Wunde p. primam geheilt. Uterus scharf anteflektiert, anscheinend an der Bauchwand adhärent
------------------------------------	----	---	--	------------------------	----------	---	-----	---	---	--	--	--

Sectio cervicalis extraperitonealis.

186. 08/09. Kl. 869	31	VII. p.	24 26 17,5 10 c. v. 8½ B. E. 11 B. M. 10½ B. A. 7,5	—	I. Schl.	—	6½	schlechte Herztöne	—	M. lebt, 3100, L. 53, K. U. 33, Sch. U. 34½, Gr. D. 11, Gr. schr. 12½, Kl. schr. 10½, Gr. qu. 9½, Kl. qu. 8	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	—
187. 09/10. Kl. 508	28	IV. p. Mit 4 Jahren laufen gelernt	c. d. 9½	—	II. Stirnl.	—	ca.	Kopf nach	4. Tag	K. lebt, 9500	—	—

188. 10/11. Kl. 585. Gyn. 441	27	II. p. Rhachitis, mit 3 Jahren lauf gelernt. I. part. Kraniotomie	26 29 18½ 9 c. v. 8 B. E. 9½ B. M. 8 B. A. 7	—	II. Schl.	—	11½	Kopf ragt über die Symphyse mehrere cm nach vorn	Temperat. subfebril Sch. U. 38, Gr. D. 11, 5, (Gr. schr. 13, Kl. schr. 10½, (Gr. qu. 9½, Kl. qu. 7	M. lebt, 3620, L. 56, K. U. 36, Sch. U. 38, Gr. D. 11, 5, (Gr. schr. 13, Kl. schr. 10½, (Gr. qu. 9½, Kl. qu. 7	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Kind: fester und zu großer Kopf; schlaff, asphyktisch. Entlassungsbefund: Uterus normal groß, anteflektiert, Bauch- wunde geschlossen	Uterus everted, an die Bauchwand fixiert
189. 10/11. Kl. 836 Gyn. 679.	27	II. p. Rhachitis, mit 3 Jahren Unfall, danach Rückgrat- ver- krümmung	21½ 25 17 c. d. 9½	—	I. Schl.	—	18½	Herztöne schwän- kend	3. Tag T. 38, 0, P. 140, Bronchitis 6. Tag, T. 39, 0, P. 120. Bauch- decken- abszess. 11. T. 38, 0, Cystitis	K. lebt, 3620, L. 52, K. U. 37½, Sch. U. 38, (Gr. D. 11½, (Gr. schr. 14, Kl. schr. 9, Gr. qu. 9½, Kl. qu. 8	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Mutter: klein, Kypho- skoliose. Walcherische Hängelage und hohe Hänge, vorgebeugt. Kind: Kopf groß, hart, große Kopfgeschwulst. Entlassungsbefund: Hängelband, Narbe fest, schmal. Am mit Ende eine kirschgroße granulierende Fläche ohne nebenswerte Sekretion Uterus anteflektiert. Bronchitis über dem linken Lungenlappen. Keine Beschwerden	Kind: fester und zu großer Kopf; schlaff, asphyktisch. Entlassungsbefund: Uterus normal groß, anteflektiert, Bauch- wunde geschlossen
190. 10/11. Kl. 1142. 11/12. Gyn. 26	29	III. p. I. part. Nabel- schnurvorfall Kind spontan, †. II. part. Früh- geburt im 9. Monat, spontan, Kind lebt	23 26 19 c. d. 10½	—	II. Schl.	—	22½	—	1. Tag T. 38, 1, P. 120. 2. Tag T. 38, 6, P. 140, bis 11. Tag T. 37, 5, starke Anämie	K. lebt, 3060, L. 49, K. U. 36, Sch. U. 37, (Gr. D. 11½, Gr. schr. 13½, Kl. schr. 9½, Gr. qu. 10, Kl. qu. 9½	Sectio cervicalis extraperi- tonealis	Mutter: klein, grazil, Beine verkrümmt, phacit. Rosenkranz. Kind: asphyktisch. Während der Operation sehr starke Blutung. Entlassungsbefund: Narbe fest. Uterus in Mittelstellung, rechts etwas an die Cervix fixiert, aber mobil. Wohlbefinden	Uterus everted, an die Bauchwand fixiert

Vera 7,4—6,5.

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen	
I. Erstgebärende.													
Wendung.													
191. 08/09. 21 Pol. 450		I. p. Rachitis, mit 5 Jahren laufen gelernt	25,5 27 16 c. d. 8½	—	I. Schl.	—	42½	Hinter- schädel- hoch- ein- stellung; Mekonium im Fruchtwasser	—	K. tot	Wendung; Mutter krumme Beine. Kopf geht nicht durchs Becken, Nabelschnur pulsirt nicht mehr. Wahrscheinlich vor- zeitige Lösung der Plazenta		
II. Mehrgebärende.													
Sectio caesarea classica.													
192. 08/09. 30 KI. 173. (syn. 173)		II. p. Vater und Schwester an Tub. 4. Rachitis, an- geblisch mit 7 J. laufen gelernt. I. part. Nabel- schnurvorf. u. Perforation	25,5 26,5 16 8,5 c. v. 6½-7 B. E. 9½ B. M. 10 B. A. 9	—	I. Schl.	—	—	Kopf nach 4. Tag 37,6; links ab- gewichen	K. lebt, 2750, L. 48, K. U. 35, Sch. U. 36, Gr. D. 11. (Gr. qu. 9½, KI. qu. 8½)	Sectio caesarea classica	Mutter: klein, grazil. Entlassungsbefund: Uterus anteflektiert, anscheinend unter- halb des Nabels fixiert, dort leichte Druckschmerzhaftig- keit. Narbe fest		
193. 09/10. KI. 352. Gyn. 346	27	II. p. Rachitis, mit 2 Jahren lauf gelernt Mit 16 Jahren Chlorose. I. part. Sectio caesarea, 1911	25,5 26,5 16 c. d. 8½	—	II. Schl.	—	8½	mit Halft. d. Bauchhieb, die v. Nabel abwärts liegt, wohl stark vor- in ihr sind direkt unter den Bauchdeck, die sehr	o. B.	M. lebt, 3000, L. 48, K. U. 35, Sch. U. 36, Gr. Dr. 11½, Gr. sehr. 13, KI. sehr. 10, Gr. qu. 8, KI. qu. 7½	Sectio caesarea classica Tuben- sterili- sation	Mutter: 145 cm groß, alte Laparotomie- wunde ½ cm breit von d. Symphyse b. hand- breit über den Nabel. Kind: asphyktisch. Entlassungsbefund: Uterus 11 cm lang, 4 cm	

Fälle ohne Angabe der c. d. oder c. v.

Life. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	geburt- sdauer	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfs- leistung	Bemerkungen
I. Erstgebärende.												
Spontangeburt.												
198, 08/09, Kl. 135.	20	I. p.	sp. i. 25 cr. i. 27 c. e. 17	—	I. Schl.	—	86 $\frac{1}{2}$	—	o. B.	K. lebt, 4040. L. 52 $\frac{1}{2}$, K. U. 37 $\frac{1}{2}$, Sch. U. 37 $\frac{1}{2}$, Gr. D. 12, Gr. schr. 15, Kl. schr. 10, Gr. qu. 9 $\frac{1}{2}$, Kl. qu. 8	Damm- naht	Mutter: Dammriß I. Gr. Kind: starke Kopf- geschwulst, Kophal- hamatom, punktiert am 3. Tage. Danach Temp. 40 und 41. Überweisung nach der Kinderklinik. Spontangeburt
199, 08/09, Kl. 766.	22	I. p.	sp. i. 24 cr. i. 26 c. e. 18	—	II. Schl.	—	29 $\frac{1}{2}$	—	o. B.	K. lebt, 3240, L. 52, K. U. 37, Sch. U. 40, Gr. D. 12, Gr. schr. 15, Kl. schr. 10 $\frac{1}{2}$, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8 $\frac{1}{2}$,	—	Kind: sehr starke Kopfgeschwulst. Spontangeburt
Zange.												
200, 08/09, Pol. 495	22	I. p.	sp. i. 25 cr. i. 27 c. e. 18	—	II. Schl.	—	—	tiefer Querstand	—	K. lebt	Forzeps, Crêd, Damm- naht	Kind: starke Kopf- geschwulst. Mutter: Dammriß I. Gr.
Hohe Zange.												
201, 08/09, Kl. 739	22	I. p. Rhachitis, mit 3 Jahren lautengelernt	sp. i. 23 cr. i. 25 $\frac{1}{2}$ c. e. 19	—	I. Schl.	—	25 $\frac{1}{2}$	Unter- schnittel- bein einstellung; Mekonium- abgang.	3. T. Pyelitis, 4. Tag Schüttel- frost, T. 39.8, 5. Tag Schüttel- frost, T. 41.0.	M. lebt, 2900, L. 50, K. U. 36, Sch. U. 36, (Gr. D. 12 $\frac{1}{2}$, Gr. schr. 14 $\frac{1}{2}$, Kl. schr. 10, (Gr. qu. 9, Kl. qu. 9)	Episio- tomie, hohe Zange, Crêd.	Mutter: klein. Atonia uteri. Kind: Druckspur am Schädel

Pol. 241
 203.08.09/28
 204.08.09/251
 205.08.09/24
 206.09.10/30
 Pol. 569
 4*

Perforation.

203.08.09/28 Pol. 579	I. p. Rhachitis, mit 3 Jahren lauten gelernt	Pro- monor. mit ge- krümmt. Finger erreichbar	—	II. Schl.	—	113½	Kon- traktions- ring. Physo- metra	1. Tag T. 39,4, P. 126, 2. Tag T. 39,0	M. tot, 3150	Perforat. (Cranioelast.) Cervix, Dammnaht	Kind: intra part. f. Mutter: Atonia uteri, Cervixrisse, Damm-scheidenriß
--------------------------	---	--	---	-----------	---	------	--	--	--------------	--	---

II. Mehrgelgebärende.

Wendung.

204.08.09/33 Pol. 251	VII. p.	Pro- monor. leicht zu erreichen	—	I. Schl.	—	—	Hinter- scheid- bein- einstellung. Dauer- kontraktion des Uterus	½ Std. p. part. Exitus matriis	M. lebt	Narkose, Wendung	Mutter: komplette Uterusruptur
205.08.09/24 Pol. 717	III. p. 2 part. Wen- dungen.Zange. Kinder leben	Pro- monor. leicht erreichbar	—	I. Schl.	—	—	Hinter- scheid- bein- einstellung. Kontrak- tionsring	—	M. lebt	Wendung, Credé, Cervix- naht	Mutter: Atonia uteri, Cervixriß
206.09.10/30 Pol. 569	VIII. p. Rhachitis, mit 4 Jahren lauf. gelernt. 1 mal Zange, 6 mal Wen- dungen	Pro- monor. sehr leicht zu erreich.	—	I. Schl.	—	—	Hinter- scheid- bein- einstellung. Herztöne leise u. un- regelmäßig. McDonnium- abgang	—	K. lebt	Narkose, Wendung	Kind: asphyktisch. Linker Arm und Klavikeln frakturiert, weil hinter der Sym- physe festgehaakt

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- maße	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	(Geburts- dauer) Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	K i n d	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
207. 09/10. Pol. 673	40	IX. p. 7 part. spont. 1 mal Forzepts.	Pro- montor. leicht zu erreichen	—	I. Schl.	—	—	Hinter- scheitel- bein- einstellg.	—	M. tot	Wendung, Crédé	Mutter: starke Atonia uteri. Kind: tiefe Asphyxie, nicht wiederbelebt
208. 10/11. Pol. 295	35	VI. p. I. u. II. part. spontan III. part. Gemini. IV. part. Nabel- schnurvorfall, Kind †. V. part. Wen- dung, Kind †	vera stark verkürzt	Pro- mont. stark vor- spring	I. Schl.	—	ca. 13	Fehlbis intra part. 3,5. Nabel- schnur- vorfall, Kopf a. die l. Darmbein- schäufel abgewieh. Herztöne 170. Mekonium- im Frucht- wasser	—	M. tot	Narkose, Wendung	Kind: asphyktisch, nicht wiederbelebt
209. 09/10. Kl. 76	38	VII. p. I. u. II. part. spontan, die anderen: Zange	sp. i. 25 cr. i. 27½ c. e. 17½	—	I. Schl.	—	ca. 13½	Herztöne 84	o. B.	M. lebt, 3310, L. 49, K. U. 34½, Sch. U. 41. Gr. D. 12, Gr. schr. 13. Kl. sehr. 10, Gr. qu. 10, Kl. qu. 8	Narkose, Wendung	Kind: linker Arm muß in der Diaphyse gebrochen werden
210. 08/09. Pol. 422	34	IV. p. 1 Totgeburt. 2 mal Perforat.	Pro- montorium leicht zu erreichen	—	I. Steißl.	—	—	Extraktion. —	—	K. tot	Hemmel- holen eines Fötus, Extraktion	—
211. 08/09. Kl. 400, Cm. 459	2	V. p. 2 mal konser- vativ	—	—	II. Schl.	—	—	Extraktion. —	—	K. lebt, 4060, L. 50, K. U. 36, Sch. U. 41. T. 37,5	Extraktion	Entlassungsbefund: caesarea

Ich gehe nun zu der Zusammenfassung der in der Tabelle zusammengestellten Fälle über.

Vera 9,5—8,5 (143).

I. Erstgebärende (38).

Spontangeburt: 18. 1 Kind mazeriert geboren, 1 Kind ist am 2. Tage gestorben unter den Zeichen der Asphyxie, 3490 g schwer; Sektionsbefund: kleinere Blutungen in den inneren Organen. Komplikationen: 1 mal Armvorfall, 3 mal Mekoniumabgang, 5 mal Asphyxie, davon 1 mal stärkeren Grades.

Wochenbetten: 5 mal gestörter Verlauf, 1 mal kompliziert durch Bronchitis und Mastitis, 1 mal Nephritis: 3,75‰ Albumen.

Operative Entbindungen: 19.

Zange: 3 mal. Ihre Anlegung war indiziert 2 mal durch Gefahr für die Mutter, 1 mal durch Gefahr für Mutter und Kind. An Hilfsoperationen wurden vorgenommen: 1 mal Muttermundsinzisionen, 1 mal Episiotomie. Komplikationen waren 2 mal Kontraktionsring, davon 1 mal mit Hydramnion.

An Schädigungen der Mutter sind zu bemerken: 1 mal ein rechtsseitiger Scheidenriß, 1 mal Dammriß II. Grades und ein Riß bis ins rechte Parametrium. Die Mutter mit der letztgenannten Verletzung ist 3 Stunden p. p. gestorben. Ich gebe einen Auszug aus der Geburtsgeschichte: Nach 85 stündigem Kreißen zeigt sich ein Kontraktionsring 1 bis 2 Querfinger unterhalb des Nabels, im Urin tritt Blut und Albumen auf, es besteht der Verdacht einer Blasenschädigung. Daher wird die Extraktion mit der Zange beschlossen, die ein oligopnoisches, bald schreiendes Kind ergibt. Starke Blutung, Crédé. Die Blutung geht weiter, sie wird durch die Feststellung eines Risses bis in das linke Parametrium erklärt. Naht dieses Risses und eines Dammrisses II. Grades. 1/2 Stunde p. p. wird der Puls klein, nicht zählbar, starke Blässe. 1 Stunde p. p. Kollaps. Trotz Digalen, Kampfer, Kochsalzinfusion, Autotransfusion 3 Stunden p. p. Exitus. Sektionsergebnis: Harnblasengrund hämorrhagisch, keine

Uterusruptur, Uterina nicht verletzt; starke Strumabildung; Todesursache unklar, wahrscheinlich Luftembolie.

1 Kind (das von der gestorbenen Frau) stirbt am 3. Tage p. p. unter Erbrechen. Es hat eine Druckmarke am rechten Scheitelbein.

1 Wochenbett war gestört: Ge +, 7 Tage lang Fieber.

Hohe Zange: 1 mal. Indikation: Gefahr für Mutter und Kind (Eklampsie, Kontraktionsring, Fieber, Herztöne 70—80). Hilfsoperationen: Muttermundsinzisionen und Episiotomie. Kind totgeboren. Schädigung der Mutter durch tiefen Riß um die Portio herum. Mutter gesund entlassen.

Wendung: 1 mal. (Die Mutter verweigerte die Aufnahme in die Klinik.) Es wird gewendet wegen Hinterscheitelbeineinstellung. Kind tot extrahiert. Mutter erleidet einen Dammriß II. Grades.

Perforation: 4 mal. Die Foeten sind bei Eingreifen des Arztes schon abgestorben. 1 mal wurde Kontraktionsring und Cyanose der Mutter, 1 mal Febris intra part. vorgefunden. Die Mütter wiesen an Verletzungen auf: 2 mal Dammriß II. Grades, 1 mal Cervixriß. Die Mütter leben alle. Von den Wochenbetten waren 3 fieberhaft.

Sectio cervicalis: 10 mal. Sie war indiziert von seiten der Mutter 3 mal (Kontraktionsring), von seiten des Kindes 4 mal (schlechte Herztöne), von seiten beider 3 mal (Kontraktionsring und schlechte Herztöne 2 mal, 1 mal Gebärmüchtigkeit wegen zu großen Kopfes. Von den Kindern wurde 1 tot geboren, das vorher schon stark geschädigt war. Bei den Müttern ist kein Todesfall zu beklagen. 1 Mutter hatte schon Fieber in der Geburt und 1 Nephritis.

9 Wochenbetten waren gestört, 1 mal zeigte sich ein Lungeninfarkt und 1 mal 1 Bauchdeckenblasenfistel. 9 Kinder wurden lebensfähig entlassen, die 10 Mütter gingen völlig geheilt nach Hause.

Außer Betracht gelassen habe ich hier eine Zwillingsgeburt, weil bei dieser weniger das enge Becken für die Therapie maßgebend ist. Es handelte sich um Placenta praevia lateralis. Das 1. Kind wird asphyktisch am Steiß

extrahiert, stirbt 7 Tage p. p. Sektion ergibt nichts. Das 2. Kind wird nach Wendung tot extrahiert, da die Mutter blutet. Beide Kinder zeigen Zeichen der Unreife. $2\frac{1}{2}$ Std. p. p.: Exitus der Mutter unter den Zeichen der Herzschwäche. Der Gesamtblutverlust wird auf 800 ccm geschätzt. Sektionsergebnis: Anämische, parenchymatöse Organe, Blutungen im Epicard, schlaffes Herz, keine Rupturen. Die wahrscheinliche Todesursache ist Luftembolie.

Resümee: Bei 19 operativ Entbundenen wurden tot geboren 3 Kinder, außerdem 4 perforierte Kinder und 1 Zwillingskind; in der nächsten Zeit starben 2 Kinder und 1 Zwillingskind. Erkrankt war eine Mutter an Eklampsie.

2 Mütter starben, davon 1 mit Placenta praevia lateralis. 15 Wochenbetten waren gestört, davon war 1 Wöchnerin krank, sie litt an Herzschwäche und Thrombose der Saphena.

II. Mehrgebärende (105).

Spontangeburt: 46 mal. Es wurde tot geboren 1 Kind; Sektionsbefund: Kleines subdurales Hämatom an der linken Hälfte der Schädelbasis um das Foramen magnum herum; Todesursache: Asphyxie. Alle übrigen Kinder waren lebensfähig. Von den Müttern starb keine. 4 mal wurde Walchersche Hängelage, 1 mal kombiniert mit Hofmeierscher Impression mit Erfolg angewendet. Bei einer Kreißenden zeigt sich am linken os pubis ein klaffender Spalt, von einer früheren Hebesteotomie herrührend (Fall 83).

Gestört waren 5 Wochenbetten, darunter erkrankte eine Wöchnerin an Bronchitis.

Operative Entbindungen: 59.

Zange: 5 mal, allemal wegen Gefahr von seiten des Kindes. 1 Kind ist tot geboren (schwer asphyktisch, nicht wiederbelebt). 1 mal wurde die Hofmeiersche Impression mit Erfolg angewendet.

Mütterliche Mortalität = 0.

Wochenbett war 1 mal gestört.

Hohe Zange: 4 mal, und zwar wurde sie 1 mal wegen Gefahr für die Mutter, 3 mal wegen Gefahr für das Kind

angelegt, unter den letzten 3 1 mal wegen Nabelschnurvorfalls.

Die Kinder wurden alle lebensfähig extrahiert. Von den Müttern starb keine.

An Nebenoperationen wurden gemacht: 1 mal Heboosteotomie, 1 mal wurde künstliche Frühgeburt wegen Nephritis eingeleitet ($12\frac{0}{100}$ Albumen und Herzschwäche).

Das Wochenbett wurde nur bei der durch künstliche Frühgeburt Entbundenen durch einen einmaligen Temperaturanstieg auf 38,1 am 3. Tage gestört.

Wendung: 31 mal, und zwar 26 mal aus Kopflage, 5 mal aus Querlage. Gründe zur Wendung lagen von seiten des Kindes 11 mal vor, darunter 6 mal Nabelschnurvorfall, von seiten der Mutter außer den 5 Querlagen 4 mal, nämlich 2 mal tiefer Plazentarsitz, 2 mal Placenta praevia totalis (beidemale Hystereuryse). Bei den übrigen 11 war die Wendung durch schlechte Einstellung des Kopfes angezeigt.

2 mal kam Armvorfall, 1 mal Fußvorfall vor.

Tot extrahiert wurden 8 Kinder, 1 davon starb nach 15 Minuten dauernder, schwacher Atmung, 1 starb ab, weil eine Narkosenasphyxie der Mutter eintrat und künstliche Atmung gemacht werden mußte; später starben noch 3 Kinder (1 an subduralem Hämatom, 1 an Asphyxie, 1 an Lebensschwäche mit einem Gewicht von 1980 g).

Bei den Kindern kamen folgende Verletzungen vor: Schädelimpressionen 5 mal, Klavikularfraktur 1 mal, Humerus- und Femurfraktur 1 mal, bei den Müttern: 1 mal Cervix- und Uterusruptur (keine Blutung).

3 mal war das Wochenbett gestört.

Extraktion: 4 mal wegen Gefahr von seiten des Kindes ausgeführt. Kinder und Mütter sind gesund entlassen worden. Bei einem Kinde mußte der Humerus frakturiert werden. 1 mal bestand ein Armvorfall.

Die Wochenbetten waren ungestört.

Perforation: 4 mal nur an toten Kindern ausgeführt, und zwar war 1 Kind bei Eintreffen des Arztes tot, 2 mal

mißlang die Wendung, 1 mal ein Hoher-Zangenversuch und die Kinder starben ab. 1 Kind davon entstammte einer Frühgeburt, es war nur 39 cm lang. 3 mal war Nabelschnurvorfall vorhanden. Mütter trugen keinerlei Schädigung davon.

1 Wochenbett war gestört: es bestand 16 Tage lang Fieber.

Sectio classica: 1 mal. Sie wird bei der Kreißenden zum zweiten Male ausgeführt und Sterilisation angeschlossen. Mutter und Kind leben, werden gesund entlassen.

Das Wochenbett war durch Bronchitis (Temperatur bis 38,2) gestört.

Sectio cervicalis: 9 mal. Indikationen waren: Gefahr von seiten der Mutter (Kontraktionsring): 1 mal, Gefahr von seiten des Kindes: 2 mal, Gefahr von beiden Seiten: 1 mal, Tumor in pelvi parvo und enges Becken: 1 mal, Gebärmümmöglichkeit: 4 mal.

1 Kind starb 1 Tag alt an Lebensschwäche von einer Frühgeburt im 9. Monat stammend (2030 g, 45 cm lang).

1 Mutter starb an akutester Streptokokkensepsis am 2. Tage.

5 Wochenbetten waren gestört, und zwar hatte 1 Wöchnerin eine Bronchitis, 1 eine Pneumonie, 3 hatten kleinere Temperaturerhöhungen von geringen Abszedierungen herrührend.

Die 8 Mütter wurden geheilt entlassen, die 8 Kinder waren lebensfähig.

Außerdem habe ich auch hier noch eine Zwillingsgeburt anzuführen. Beide Kinder waren lebensfähig spontan geboren. Die Mutter blieb gesund.

Resümee. Von den 59 Mehrgebärenden, die operativ entbunden wurden, starb 1. An toten Kindern zähle ich 17, und zwar fallen 1 der Zange, 11 (4 bei Placenta praevia lateralis resp. totalis) der Wendung, 1 der *Sectio cervicalis* zur Last, 4 Kinder wurden perforiert.

11 Wöchnerinnen hatten gestörte Wochenbetten.

Vera 8,4—7,5 (47).

I. Erstgebärende (12).

Spontangeburt: 4. 1 mal wurde Walchersche Hängelage, 1 mal der Cristellersche Handgriff mit Erfolg angewendet. 1 Kind starb mit 2 Tagen an Krämpfen, 2550 g schwer; Sektionsbefund: großes subdurales Hämatom.

1 Kind erlitt eine Fazialisparese und eine Impression des rechten Scheitelbeines, 1 eine leichte Impression der rechten Schläfengegend, 2 hatten Druckmarken.

Alle Mütter wurden nach gesunden Wochenbetten entlassen.

Operative Entbindungen: 8.

Zange: 1 mal wegen schlechter Herztöne angelegt. Kind, 2450 g, schwer asphyktisch, stirbt 1 Stunde p. p. trotz guten Herzschlages. Hilfsoperation: Episiotomie. Wochenbett vom 8. Tage an fieberhaft, $3\frac{1}{2}\%$ Albumen.

Hohe Zange: 1 mal indiziert im Interesse von Mutter und Kind, vorgenommen nach Muttermundsinzisionen. Kind am nächsten Tage gestorben. 3400 g schwer. Wochenbett 8 Tage lang gestört.

Wendung: 1 mal wegen Querlage. Kind tot, der nachfolgende Kopf mußte perforiert werden.

Perforation: 2 mal. Beide Kinder bei Eingriffen des Arztes tot. 1 mal Dehnungsercheinungen des Uterus und Physometra. Wochenbett 1 mal gestört.

Sectio cervicalis: 3 mal. 1 mal ist die Mutter in Gefahr (Kontraktionsring), 1 mal sind Mutter und Kind in Gefahr (Dauerkontraktionen und schlechte Herztöne) und einmal besteht fehlerhafte Kopfeinstellung.

Die Kinder sind lebensfähig geboren. Die Mütter werden gesund entlassen. 1 Wochenbett war in geringem Maße gestört (38,0 an 2 Tagen).

Resümee: Von den 12 Kreißenden ist keine gestorben. 1 Kind starb nach Spontangeburt am 2. Tage. Bei den operativen Entbindungen wurde 1 Kind bei Zange, 1 bei Wendung tot geboren. 2 Kinder wurden perforiert. 1 Kind

starb am nächsten Tage, es fällt der hohen Zange zur Last. 4 Wochenbetten waren gestört.

II. Mehrgebärende (35).

Spontangeburt: 8. 1 mal wurde Walchersche Hängelage, kombiniert mit Hofmeierscher Impression mit Erfolg angewendet. 1 Kind starb am 2. Tage p. p. an Lebensschwäche. (1020 g, 38 cm lang, partus praematurus mensis VII.) Es kann außer Betracht gelassen werden, weil der Tod in keiner Weise mit dem engen Becken zusammenhängt. Mütter leben alle. Wochenbetten o. B.

Operative Entbindungen: 27.

Zange: 2 mal, beidemal wegen Gefahr für das Kind angelegt. 1 mal wird Episiotomie gemacht. Kinder und Mütter wurden gesund entlassen. Wochenbetten o. B.

Wendung: 12 mal, aus Kopflage 8 mal, aus Querlage 4 mal. Gründe zur Wendung außer Querlage: Hinter-scheitelbeineinstellung 1 mal; Gründe von seiten des Kindes 7 mal, und zwar: 3 mal Nabelschnurvorfal, 1 mal Nabelschnur- und Armvorfal, 1 mal Armvorfal und vorzeitige Plazentalösung. 1 mal wurde Hystereuryse angewendet. Mütter leben alle. Von den Kindern wurden 7 tot extrahiert, davon mußten 2 am nachfolgenden Kopf perforiert werden. Nachträglich starb keines. An Verletzungen der Kinder fand ich: 2 mal Schädelimpressionen (bei toten Kindern), 2 mal Klavikularfrakturen. Von den 2 klinisch beobachteten Fällen war 1 durch einen einmaligen Temperaturanstieg auf 38,0 gestört.

Extraktion: 4 mal. 2 mal wurden die kindlichen Herztöne schlecht, 1 mal war der Steiß abgewichen. Bei 2 Kindern muß der nachfolgende Kopf perforiert werden, 1 Kind stirbt 10 Minuten p. p., nachdem es vorher spontan geatmet hat. Bei diesem ist die Klavikel frakturiert und eine Impression auf dem rechten Scheitelbein.

Perforation: 2 mal an toten Kindern, beidemal wird Nabelschnurvorfal festgestellt, außerdem besteht 1 mal

Tympania uteri und 38,2 Temperatur, 1 mal fehlerhafte Einstellung. Kinder wiegen 2550 und 2180 g. 1 Wochenbett war gestört; an den ersten 3 Tagen bis 39,1 Temperatur, im Lochialsekret fanden sich Strepto- und Staphylokokken.

Sectio classica: 1 mal wegen voraussichtlicher Gebärunmöglichkeit. Kind und Mutter wurden gesund entlassen. Wochenbett ungestört.

Sectio cervicalis: 6 mal. Sie war 2 mal von seiten des Kindes, 1 mal von seiten der Mutter (Kontraktionsring), 3 mal durch voraussichtliche Gebärunmöglichkeit indiziert. Die Kinder waren alle lebensfähig mit einem Durchschnittsgewicht von 3391 g, das größte wog 3740 g, das kleinste 3060 g. 4 Wochenbetten waren gestört, 2 mal durch Bronchitis kompliziert, von diesen wieder 1 durch Cystitis und einen Bauchdeckenabszeß, bei der anderen bestand eine starke Anämie.

Resümee: Von den 27 operativen Fällen starben bei der Geburt 9 Kinder, nachher 1; 2 Kinder wurden tot perforiert. Von den Müttern starb keine. 6 Wochenbetten waren gestört.

Vera 7,4—6,5 (7).

I. Erstgebärende (1).

Wendung: 1 mal wegen Hinterscheitelbeineinstellung und Schädigung des Kindes. Der nachfolgende Kopf muß perforiert werden.

II. Mehrgebärende (6).

Sectio classica: 3 mal. Indikation: 1 mal fehlerhafte Einstellung des Kopfes, 1 mal Verdacht auf Spontanruptur nach vorangegangener Sectio classica, 1 mal Gebärunmöglichkeit. In den beiden letzten Fällen wurde Sterilisation angeschlossen. Über den 2. Fall finde ich in der Geburts-geschichte folgendes: „Da die Frau sterilisiert sein will, muß Kaiserschnitt gemacht werden, der um so notwendiger ist, als ein eigentümlicher Befund vorhanden ist: Die untere Hälfte der Bauchnarbe, die vom Nabel abwärts liegt, wölbt sich stark vor. In ihr sind unmittelbar hinter den Bauchdecken, welche sehr dünn sind, Kindsteile zu fühlen und

zwar so deutlich, als wenn keine Uteruswand dazwischen wäre. Hier scheint s. Z. der Uterusschnitt nicht geheilt zu sein. Schnitt unterhalb des Nabels teilweise in der alten Narbe, teilweise unterhalb. Uterus überall adhärent; wo die Adhäsionen getrennt werden, teils stumpf, teils mit dem Paquelin, liegt Eibläse vor.“ —

Alle Kinder sind lebensfähig geboren, die Mütter sind gesund entlassen worden. 1 Wochenbett war subfebril.

Sectio cervicalis: 3 mal. Die Operation wurde vorgenommen: 1 mal der Mutter wegen (Kontraktionsring), 2 mal wegen schlechter Einstellung und voraussichtlicher Gebärmöglichkeit. Die Kinder und Mütter werden gesund entlassen. 1 Wochenbett war gestört (Temperatur bis 38,4).

Resümee: 6 operativ gewonnene Kinder sind lebensfähig, die Mütter wurden mit gutem Befinden entlassen. 2 Wochenbetten waren gestört.

Fälle ohne Angabe der c. d. oder c. v. (14).

I. Erstgebärende (6).

Spontangeburt: 2. Die Kinder sind lebensfähig, 1 hat ein Kephalhämatom davongetragen. Wochenbetteno. B.

Operative Geburten: 4.

Zange: 1 mal wegen tiefen Querstands. Kind ist lebensfähig.

Hohe Zange: 1 mal. Indikation von seiten des Kindes. Hilfsoperation: Episiotomie. Kind lebensfähig, Druckspur am Schädel. Mutter lebt. Wochenbett fieberhaft, kompliziert durch Pyelitis.

Wendung: 1 mal. Kind geschädigt, tief asphyktisch, nicht wiederbelebt, 3700 g schwer. Mutter erleidet einen totalen Dammriß.

Perforation: 1 mal. Kind schon tot. Kontraktionsring, Physometra. Wochenbett am 1. und 2. Tag fieberhaft.

Resümee: Bei 4 operativen Fällen ist 1 Kind tot geboren, 1 Kind wurde perforiert. Mütter leben alle. 2 Wochenbetten waren gestört, 1 mal nach hoher Zange, 1 mal nach Perforation.

II. Mehrgebärende (8).

Wendung: 6 mal. Sie wurde vorgenommen: 2 mal wegen der Mutter (Kontraktionsring); 3 mal wegen des Kindes, 1 mal wegen fehlerhafter Einstellung, 4 mal wurde Hinterscheitelbeineinstellung, 1 mal Nabelschnurvorfall beobachtet. 2 Kinder wurden tot extrahiert. 1 Mutter starb $\frac{1}{2}$ Stunde p. p. an kompletter Uterusruptur. 1 Kind trug eine Oberarm- und Klavikularfraktur davon, bei einem Kinde wurde der Arm absichtlich frakturiert. Das eine klinisch beobachtete Wochenbett war ungestört.

Extraktion: 1 mal. Der Foet war mazeriert.

Seetio classica: 1 mal. Sie wird zum dritten Male bei derselben Frau vorgenommen und Sterilisation angeschlossen. Das Kind ist lebensfähig. Die Mutter wird nach ungestörtem Wochenbett entlassen.

Resümee: 1 Mutter ist gestorben. 2 Kinder wurden tot geboren, 1 Kind war mazeriert. Geschädigt durch Frakturen waren 2 Kinder. Die Wochenbetten waren ungestört.

Nachdem ich diese Übersicht über Geburten bei den einzelnen Graden der Beckenverengung erledigt habe, gehe ich zur Besprechung der einzelnen Geburtsmodi über. Vorher möchte ich erwähnen, daß ich nach dem Vorgange von Glückner und Metzler in der Berechnung der Mortalität der Kinder die Fälle von mazerierten Foeten außer Betracht lasse, aber die Fälle mitrechne, in denen das Kind bei Eingreifen des Arztes schon tot oder im Absterben begriffen war. Die bis zur Entlassung resp. bis zum Ende der Behandlung gestorbenen Kinder werden im allgemeinen als tot angesehen. Die Mortalität der Mütter wird aus allen Fällen, gleichviel welche Komplikationen sich ergeben haben, berechnet und die Todesfälle werden der jeweiligen Entbindungsart zur Last gelegt.

Die Gesamtmortalität der Mütter beträgt $3 = 1,42\%$ (Glückner $1,4\%$, Metzler $0,92\%$, Yamasaki $0,92\%$), die der Kinder $52 = 25,07\%$ (Glückner $20,4\%$, Metzler $14,91\%$,

Yamasaki 11,2%), wobei 2 mazerierte Foeten und 2 Zwillingsgeburten ausgeschlossen sind. Dabei stellt sich die Zahl für die Geschlechter auf 36 Knaben und 16 Mädchen, mit demselben Ausschluß wie vorher, d. h. von den toten Kindern sind 69,12% Knaben und nur 30,76% Mädchen, eine Beobachtung, die auch schon öfter, so auch von Metzler und Glückner gemacht worden ist.

Bei einzelnen der verschiedenen Geburtsmodi wird es auffallen, daß die Resultate wesentlich schlechter erscheinen, als bei andern Statistiken. Dies ist einerseits damit zu erklären, daß bei meiner Zusammenstellung ein recht großer Teil der Poliklinik entnommen ist, die ja meist nur zu schwereren Eingriffen gerufen wird und Spontangeburt sehr selten zu sehen bekommt. Andererseits mögen eine ganze Anzahl poliklinischer und klinischer Geburten spontan verlaufen sein, bei denen eine Messung nicht vorgenommen werden konnte, oder operativ mit guten Resultaten beendet worden sein, bei denen ein notwendiges rasches Eingreifen eine Messung verhinderte. Ferner kommt es auch auf die Definition des engen Beckens an. Hannes hat auf den großen Unterschied in den Resultaten der Klinik selbst aufmerksam gemacht; der Unterschied wurde durch die Verschiedenheit in der Festlegung der oberen Grenze des engen Beckens bedingt. Besonders stark tritt er bei den Spontangeburt in Erscheinung. Endlich habe ich viele Fälle unter dem klinischen Material gefunden, die von draußen durch schlechte Geburtsleitung verschleppt, vielleicht auch durch mehrfache Untersuchung infiziert eingeliefert wurden, also geeignet sind, die Resultate wesentlich zu verschlechtern.

I. Spontangeburt.

Die von allen Kliniken anerkannte Forderung, die Geburt bei engen Becken nach Möglichkeit spontan verlaufen zu lassen, ist selbstverständlich auch für die Breslauer Klinik maßgebend, wie Hannes betont hat. Wenn verhältnismäßig wenig spontane Geburten beobachtet wurden, so liegt das

eben daran, daß das Material zu einem bedeutenden Teil der Poliklinik entstammt, und zwar sind von den 211 Fällen 71 poliklinisch beobachtet worden. Der weitaus größte Teil der Spontangeburt findet sich aber bei dem klinischen Material und, da die Poliklinik die spontan verlaufenden Geburten naturgemäß nicht zu sehen bekommt, ist natürlich der Prozentsatz der operativen Geburten verhältnismäßig hoch. Sind doch poliklinisch nur 10 Spontangeburt bei engem Becken beobachtet worden.

Im ganzen sind in den 211 Fällen die Geburten 78 mal spontan verlaufen = in 37,32%, ausgeschlossen die Zwillingsgeburt. Kohn hat 27% Spontangeburt gefunden. Rechne ich die in der Klinik Entbundenen allein, so habe ich unter 140 klinischen Geburten 66 Spontangeburt, d. h. 47,14%, eine Zahl, die im Vergleich zu Metzler mit 82,83% und Yamasaki mit 69,6% immer noch gering ist. Die Gründe hierfür habe ich oben erörtert.

Von den 78 Geburten waren:

Erstgebärende	Mehrgebärende
c.v. 9,5—8,5 = 48,6% (Kohn 68%)	= 44,3% (Kohn 42,8%)
c.v. 8,4—7,5 = 33,3% (Kohn 58%)	= 22,8% (Kohn 28%).

Wenn auch die absolute Zahlengröße im Vergleich zu Kohn etwas verschoben ist und nicht so kraß in die Augen tritt, ist doch auch hier die Bemerkung zu machen, daß bei Mehrgebärenden die Spontangeburt prozentualiter abnehmen, die pathologischen Geburten sich steigern.

Das Durchschnittsgewicht der Kinder stellt sich bei sämtlichen Spontangeburt auf 3220,5 g, bei den Erstgebärenden auf 3248 g, bei den Mehrgebärenden auf 3179,3 g. Es fanden

	bei Erst- gebärenden	Mehr- gebärenden	allen Geburten
Kohn	2834	2705	2765
Heinsius	3036	3136	3074
Knapp	2753	3218	—
Franke	3057	3250	—

Bei den einzelnen Graden der Beckenverengung fand ich:

	Erstgebärende	Mehrgebärende
c. v. 9,5—8,5 . . .	2941,6	3300,2
c. v. 8,4—7,5 . . .	3162,5	3058,5

Durchschnittsgewicht.

Das größte Gewicht war bei einer Erstgebärenden 4040 g, das kleinste 2350 g, bei Mehrgebärenden 4170 g und 1020 g.

Die Kinder lagen sämtlich in Schädellage.

Ungünstige Einstellungen oder Vorkommnisse gelangten folgende zur Beobachtung: Hinterscheitelbeineinstellung 7 mal = in 9% der Fälle. Armvorfall 2 mal = 2,6%, Abweichen des Kopfes 2 mal = 2,6%.

An Hilfsmitteln wurde außer geeigneter Lagerung mit Erfolg angewendet: Walchersche Hängelage 5 mal, davon 1 mal bei Kopfumfang von 37,5 und 1 mal bei einem solchen von 37 cm, Hofmeiersche Impression 2 mal.

Die durchschnittliche Geburtsdauer bei den Spontan-geburten beträgt 28,5 Stunden (Kohn: 23,1, Heinsius 23,3, Knapp 21,8, Ludwig und Savor 21,3, Litzmann 15,09).

Vorzeitigen Blasensprung finde ich bei 8 Spontangeburt-
en notiert. Er wurde bei allen Geburten 25 mal beobachtet,
d. h. in 11,9% aller Fälle. (Kohn 7,9%, Heinsius 13,6%,
Knapp 22,2%, Franke 19,8%). Daß vorzeitiger Blasen-
sprung für einen Teil der nicht spontan verlaufenden Fälle
verantwortlich zu machen ist, ist aus folgendem zu ersehen:
Bei 78 spontanen Geburten kommt vorzeitiger Blasensprung
nur 8 mal vor, bei 131 operativ beendigten dagegen 17 mal,
d. h. in 10,2% zu 12,9%.

Die kindliche Mortalität betrug 4; 1 mazerierter Foet
wird nicht eingerechnet. 1 Kind wurde schwer asphyktisch
geboren, 3 starben in der Folgezeit. Es ergibt dies eine
Mortalität von 5,19%. Da aber davon 1 Kind einer spon-
tanen Frühgeburt entstammt (1020 g), brauche ich es nicht
dem engen Becken zur Last zu legen, die Mortalität beträgt
also dann 3,94%. Kohn gibt eine solche von 3,4% an,
hat aber in der Tat eine solche von 4,04% (4 tote Kinder

bei 89 Geburten). (Heinsius 4,83%, Knapp 4,9%, Metzler 2,05%, Peham 3,64%, Yamasaki 2,5%.)

Die mütterliche Mortalität beträgt 0%.

8 Kinder trugen Verletzungen davon = 10,2%. Rechne ich, wie Kohn und Heinsius, Asphyxien dazu, so finde ich 21 Fälle = 26,5%. (Kohn 17,2%, Heinsius 27,4%.) Kopfgeschwulst rechne ich nicht zu den Verletzungen des Kindes. Im einzelnen fand ich 12 mal Asphyxien und zwar 9 leichte und 3 schwere, d. h. 15,3% resp. 11,5% resp. 3,8%, Fazialisparese 2 mal = 2,5%, Impressionen 4 mal = 5,1%, Druckmarken 2 mal = 2,5%, Kephalhämatom 1 mal = 1,2%.

Verletzungen der Mütter fanden sich 2 mal und bestanden aus einem Dammriß I. und II. Grades.

Temperatursteigerungen hatten, abgesehen von den die Temperatur hervorrufenden Komplikationen, 4 Wöchnerinnen und zwar keine länger als an zwei Tagen = 5,12%. (Kohn 11,2%, Heinsius 5%, Knapp 4,9%). Die Höchsttemperatur betrug 39,6, die bei einer Wöchnerin 1 mal auftrat, wahrscheinlich infolge Gonorrhoe.

II. Zange.

Die Zange wurde unter den 211 Geburtsfällen 19 mal angelegt, d. h. in 9% der Fälle (Kohn 14,9%, Heinsius 20,8%, Knapp 16,19%, bei Yamasaki berechne ich 3,9%).

Auf 57 Erstgebärende entfallen 8 Zangen = 14%. auf 154 Mehrgebärende 11 = 7,1%. Diese Tatsache erwähnt auch Kohn, der 28,5% und 9,4% findet und Peham und Yamasaki erklären sie damit, daß „gerade nach Überwindung des größten Hindernisses im verengten Beckeneingang bei den Erstgebärenden die wenig dehnungsfähigen Weichteile in Verbindung mit der oft eintretenden Wehenschwäche den raschen Austritt des Kindes verhindern und damit eine Gefahr für das kindliche Leben heraufbeschwören können“. Auch Scheffzek betont das. Und dieser Ansicht kann man sich voll und ganz anschließen.

Die Mortalität der Kinder betrug 21%, 2 waren totgeboren, 1 schwer asphyktisch, nicht wiederbelebt, 1 starb am 2. Tage p. p. (Kohn gibt 10,7% an, Heinsius 14,2%, Kapischke 11,77%).

Von den Müttern starb 1 = 5,2%. Die Geburts-geschichte habe ich schon vorn wiedergegeben.

Die große Zahl der Mortalität erklärt sich daraus, daß bei der geringen Anzahl der Fälle die Statistik nicht einwandfrei ist.

a) Typische Zange.

12 Geburten wurden durch sie beendet, das sind 5,6%. 5 mal waren es Erstgebärende = 8%, 7 mal Mehrgebärende = 4,5%. Scheffzek fand 10,1% resp. 6%, Bürger 7% resp. 3,9%.

Ihre Anlegung wurde indiziert 3 mal im Interesse der Mutter = 25%, 6 mal im Interesse des Kindes = 50%, 3 mal im Interesse beider = 25%, und zwar waren im genaueren die Gründe: Kontraktionsring 2 mal, tiefer Querstand 2 mal, fehlerhafte Einstellung des Kopfes 1 mal, schlechte Herztöne 5 mal, Nabelschnurvorfall 1 mal, fehlerhafte Einstellung und schlechte Herztöne 1 mal.

An Hilfsoperationen wurden angewendet 1 mal Muttermundsinzisionen, 3 mal Episiotomie, 1 mal Hofmeiersche Impression. 2 mal sprang vorzeitig die Blase.

Von den Müttern erlitten 2 Scheidenrisse, je 1 einen Dammriß I. und 1 Dammriß II. Grades. 1 Kind trug eine Druckmarke davon, 4 mal kam leichte Asphyxie vor. Eine Mutter starb 3 Stunden p. p. (Fall 20) = 8,3% Mortalität.

Von den Kindern starben 3, 2 waren schwer asphyktisch, konnten nicht wiederbelebt werden, 1 mit einer Druckmarke starb 2 Tage p. p. Es entspräche dies einer Mortalität von 25%, wenn nicht die geringe Zahl der Fälle dieser Zahl ihren Wert bis zu einem gewissen Grade nähme. Immerhin haben Glückner auch 19,7% Mortalität, Metzler 14,6%, Scheffzek 15%, Peham 17,2%, Ludwig und Savor 21,7%. Es liegt diese hohe Zahl daran, daß man ja mit dem Gebrauch

der Zange wartet, bis sich eine gewisse Schädigung des Kindes feststellen läßt.

Das Wochenbett zeigt in 3 Fällen leichtes Fieber, d. h. in 25 %. (Kohn 13,9 %, Heinsius 13 %, Kapischke 29,41 %.) 1 Wöchnerin davon war krank: $3\frac{1}{2}\%$ Albumen. Alle 3 Fälle wurden völlig geheilt entlassen.

Das Durchschnittsgewicht der Kinder betrug 3251 g, das größte wog 4070 g, das kleinste 2450 g.

b) Hohe Zange.

Die hohe Zange wird nach den Grundsätzen von Herrn Geheimrat Küstner nur von sehr geübter Hand ausgeführt. Gelingt sie nicht bald, dann muß ein anderer Entbindungsmodus Platz greifen. Hannes hat die Grundsätze genauer ausgeführt und begründet in seiner Abhandlung „Die Therapie beim engen Becken und ihre Wandlungen“. Er betrachtet die hohe Zange als einen letzten Versuch, das lebende Kind vor der Perforation zu retten, und spricht die Hoffnung aus, die hohe Zange durch den extraperitonealen Kaiserschnitt einschränken zu können.

Die hohe Zange wurde 7 mal ausgeführt. Sie wurde 1 mal mit Rücksicht auf die Mutter, 3 mal im Interesse des Kindes und 3 mal wegen Gefahr für beide angelegt, und zwar hatte 1 mal die Mutter Eklampsie, Kontraktionsring, Fieber in der Geburt und dazu wurden noch die kindlichen Herztöne schlecht (Fall 22), 1 mal bestand Fieber in der Geburt und schlechte Herztöne, 2 mal waren schlechte Herztöne vorhanden, 1 mal hatte die Mutter 12 % Albumen und Herzschwäche.

Vorzeitiger Blasensprung ist nur 1 mal erwähnt.

Von vornherein möchte ich 2 Fälle herausgreifen, bei denen vor der hohen Zange Operationen angewendet wurden, die ich im Gegensatz zu anderen nicht besonders erwähne. Es sind dies die Fälle 91 und 92. Ich habe diese nicht besonders aufgeführt, weil von jeder dieser Operationen nur 1 Fall vorhanden ist. Der 1. Fall ist eine Hebstosteotomie, nach der mit gutem Erfolge hohe Zange gemacht wurde.

Das Kind war wohl, die Mutter hatte am 28. Tage nur noch etwas Gebeschwerden. Der 2. Fall war eine künstliche Frühgeburt wegen schwerer Nephritis und Herzschwäche, durch Hystereuryse eingeleitet. Auch hier gelang die hohe Zange vollkommen, das Kind war lebensfähig, die Mutter hatte nur eine einmalige Temperatursteigerung auf $38,1^{\circ}$ am 3. Tage. Die Gründe für die geringe Anzahl der beiden Entbindungsmodi führt Hannes auch in der eben zitierten Arbeit aus. Die dort vorausgesagte Möglichkeit, diese beiden Entbindungsarten durch den zervikalen, speziell den extraperitonealen Kaiserschnitt zu ersetzen, ist eben eingetroffen.

Muttermundsinzisionen wurden 1 mal, Episiotomie 1 mal, beides zusammen 1 mal in Anwendung gebracht.

Von Schädigungen der Mütter sind zu erwähnen: 1 mal erweist sich die hintere Scheidenwand um die Portio herum tief eingerissen, 1 mal ist ein Dammriß II. Grades entstanden. Gestorben ist keine Mutter.

Bei den durch hohe Zange gewonnenen Kindern werden folgende Schädigungen bemerkt: 1 mal Druckmarke, 1 leichte und 4 schwere Asphyxien. Von den letzten wurde 1 Kind nicht wiederbelebt, 3360 g schwer, 54 cm lang. 1 Kind starb am nächsten Tage. Das sind 2 kindliche Todesfälle, die einer Mortalität von $29,5\%$ entsprechen. Scheffzek hat eine solche von $40,2\%$, Baisch von $43,8\%$.

Es ist schon verschiedentlich darauf aufmerksam gemacht worden, daß die hohe Zange, von geübter Hand, ausgeführt gar nicht die schlechten Resultate liefert, die man ihr unterschiebt. Sie wird sie nicht haben, wenn sie, wie Hannes es will, weder systematisch angewendet, noch völlig verworfen wird. Er meint, daß es Fälle gibt, in denen sich auch eine so exspektative Geburtsleitung, wie die der Breslauer Klinik ist, zur hohen Zange entschließt, um noch das Kind zu retten, ohne die Mutter zu gefährden. Daß ihre Indikation nicht dahin gestellt werden darf, durch sie ein größeres Mißverhältnis zwischen Kopf und Becken überwinden zu wollen, erwähnt Bürger, und Scheffzek ist der

Ansicht, daß „die hohe Zange da segensreich für Mutter und Kind bleiben wird, wo die Triebkraft des erlahmten Uterusmuskels nicht mehr ausreicht, um den Kopf durch den Beckeneingang zu pressen oder wo eine Schädigung des Kindes manifest wird. Nie darf man es unternehmen, unter Mißachtung der Proportion zwischen Kopf und Becken mit roher Kraft dem Kopf den Weg durch das Becken mit der Zange zu bahnen“. Auch die schon von Kohn von anderen Autoren erwähnten Resultate bestätigen diese Erfahrung. Ich habe verschiedentlich in den Geburtsgeschichten Notizen gefunden, die dafür zeugen, daß auch in der Breslauer Klinik die hohe Zange stets nur zunächst versucht wird. Gelingt sie nicht bald, dann kommt ein anderer Entbindungsmodus zur Ausführung, und zwar jetzt meist der extraperitoneale Kaiserschnitt, der ja noch weit bessere Resultate liefert.

Das Durchschnittsgewicht der Kinder betrug 3057 g, das schwerste hatte 3600 g, das kleinste 2420 g.

4 gestörte Wochenbetten kamen vor, 1 mal davon in höherem Grade kompliziert durch Pyelitis.

Wendung.

Es handelt sich nur um indizierte Wendungen, die prophylaktische verwirft Herr Geheimrat Küstner. Hannes begründet dies damit, daß einerseits die Resultate der prophylaktischen Wendung recht schlecht sind, andererseits eine exspektative Geburtsleitung prophylaktische Maßnahmen verwerfen muß, wenn ihr sichere andere Hilfsmittel zur Verfügung stehen.

Die Wendung auf den Fuß wurde in 53 Fällen vorgenommen, das sind 25,3% der Geburten bei engem Becken. (Kohn 21,4%, Heinsius 10,6%, Knapp 16,19%, Glöckner 17,3%.)

Bei Erstgebärenden wurde sie 4 mal ausgeführt und zwar 1 mal wegen Querlage, 1 mal wegen Stirnlage, 2 mal wegen Hinterscheitelbeineinstellung, letztere nur 1 mal durch schlechte kindliche Herztöne indiziert. Sie wurde also fast

ausschließlich nach strenger Indikation durch Gefahr von seiten der Mutter angewendet. 1 Mutter verweigerte strikt die Aufnahme in die Klinik. Alle 4 Kinder sind totgeboren, 2 mußten am nachfolgenden Kopf perforiert werden. Diese Resultate zeigen zur Evidenz die schlechten Erfolge der Wendung bei Erstgebärenden. Hannes hoffte deshalb schon 1908 eine starke Einschränkung der Wendung bei Erstgebärenden durch den zervikalen Kaiserschnitt.

Nach dieser Abschweifung auf die Wendungen bei Erstgebärenden behandle ich die Resultate der Wendung im allgemeinen.

Die Indikationen zur Wendung waren: Querlage 10 mal = 18,8% (Kohn 19,3%). Ungünstige Kopfeinstellung 21 mal = 39,6% (Kohn 32,2%). Vorfall der Nabelschnur 10 mal = 18,8% (Kohn 29%). Vorfall kleiner Teile 4 mal = 7,5% (Kohn 14,5%). Außerdem handelte es sich 1 mal um Stirnlage, 1 mal um Kontraktionsring, 2 mal um Placenta praevia totalis, 3 mal um drohende Asphyxie des Kindes.

Es kam also in Betracht: Gefahr von seiten des Kindes 17 mal = 32%. Gefahr von seiten der Mutter 38 mal = 71,6%. Es überwiegen also bei der Wendung wesentlich die Interessen der Mutter.

Verletzungen der Kinder kamen in 16 Fällen vor = 30,2% (Kohn 11,2%), und zwar Schädelimpressionen 8 mal, Klavikularfrakturen 3 mal, Arm- und Klavikularfraktur 1 mal, Humerusfraktur 1 mal, Humerus- und Femurfraktur 1 mal, Plexuslähmung 1 mal, Druckmarke 1 mal. Asphyktisch wurden 23 Kinder geboren = 43,3% (Kohn 37%). Davon sind 5 so schwer asphyktisch, daß die Wiederbelebung mißlingt, 5 schwer asphyktisch und 13 leicht.

Verletzungen der Mutter sind 12 mal notiert = 22,6% (Kohn 14,5%). 2 mal zeigte sich eine Uterusruptur, davon war 1 tödlich, 5 mal Dammriß II. Grades, 1 mal ein totaler Dammriß (bei einer Erstgebärenden), 3 mal Cervixriß, 1 mal Scheidenriß.

Hystereuryse wurde 3 mal in Anwendung gebracht, davon 2 mal bei Placenta praevia totalis.

Von den Müttern ist 1 gestorben, $\frac{1}{2}$ Stunde p. p. an kompletter Uterusruptur. Es ergibt sich also eine Mortalität von 1,8% (Metzler 2,19%, Glöckner 1,9%.)

Die kindliche Mortalität bei der Wendung ist, wie Baisch berechnet hat, an sich schon eine recht hohe. Baisch findet für alle Becken eine Mortalität von 50%, wozu noch nach seiner Schätzung 15—20% Fälle kämen, in denen die Kinder in den ersten 5 Tagen post partum abstürben. Nach Winckel beträgt die Mortalität 40—60%. Zieht man in Betracht, daß die Wendungen bei engem Becken noch besonders schlechte Resultate geben, so sind die folgenden Resultate recht günstige zu nennen.

Der Wendung fielen 25 Kinder zum Opfer, d. s. 47,1%. 20 starben während der Wendung und Extraktion ab (davon 1 bei vorzeitiger Plazentarlösung), 2 bei Placenta praevia totalis, 1 Kind war bei Eingreifen des Arztes tot, 1 Kind von 1980 g starb an Lebensschwäche in der Nacht p. p., 1 Kind starb 4 Tage p. p. an subduralem Hämatom. Rechne ich die 4 Todeställe ab, die weder der Wendung noch dem engen Becken zur Last fallen, nämlich die 3 infolge Plazentaranomalien und das 1 an Lebensschwäche gestorbene, so habe ich eine Mortalität von 42,8%.

Kohn rechnet die Wendungen mit Perforation des nachfolgenden Kopfes nicht ein, ein Vorgehen, das natürlich die Resultate erheblich verbessert. Er hat daher nur 29% kindliche Mortalität. Unter Auslassung der Perforation am nachfolgenden Kopfe bekomme ich nur 34,7% Mortalität.

Andere, die die Perforation mitrechnen, haben folgende Mortalitätsziffern: Scheffzek 59,6%, Metzler 33,57%, Glöckner 34%, Ludwig und Savor 50,3%, Heinsius bei Einrechnung aller toten Kinder 35,7%.

Die Perforation des nachfolgenden Kopfes wurde in den von mir zusammengestellten Fällen 6 mal nötig; also in 24% der bei der Wendung gestorbenen Kinder.

Sehr stark wird die durch Nabelschnurvorfall indizierte Wendung durch diese Komplikation in ihrem Erfolge getrübt: bei 10 Fällen von Nabelschnurvorfal wurden 7 Kinder tot

extrahiert, d. h. in 70% der Nabelschnurvorfälle gab die Wendung tote Kinder, oder in 13,2% aller Wendungen sterben Kinder mit Nabelschnurvorfall ab.

Von den 13 klinisch beobachteten Wochenbetten waren 4 gestört. 1 mal bestand die Temperatursteigerung 4 Tage lang. 3 mal wurde eine nur einmalige Temperatursteigerung registriert. Eine Störung fand also in 30,7% statt. Heinsius fand sie in 28,5%, Kohn nur in 12,5%, auch wohl eine Folge des Nichteinrechnens der Perforationen.

Sämtliche Resultate der Wendung stimmen also so ziemlich mit denen anderer überein. Die schon von Winckel hervorgehobene starke Mortalität der Kinder, zusammen mit einer immerhin ziemlich großen Gefahr für die Mutter rechtfertigen daher die später zusammengefaßte häufigere Anwendung der Sectio cervicalis, die erheblich bessere Resultate liefert.

Extraktion.

Obwohl die Extraktion durch das enge Becken nur eine sehr geringe Beeinflussung in ihren Resultaten erfährt, möchte ich diese Fälle aus meiner Zusammenstellung doch erwähnen.

Es wurde in 9 Fällen extrahiert = 4,26% aller Fälle (Metzler 3,85%, Scheffzek nur 0,6%), und zwar kamen nur Mehrgebärende zur Beobachtung.

Vorzeitiger Blasensprung trat 2 mal ein, d. h. in 22% der Fälle. Der Steiß war in 4 Fällen abgewichen, dabei bestand 1 mal Armvorfall. Schlechte Herztöne bewogen 2 mal zur Extraktion. Bei den Kindern kamen folgende Verletzungen vor: je 1 mal Druckmarke, Humerusbruch, Klavikularbruch, 1 mal eine Schädelimpression. Die Verletzungen sind hier also ziemlich häufig. 3 Kinder waren asphyktisch, 2 leicht, 1 tief.

2 Mütter trugen einen Dammriß II. Grades davon.

Die kindliche Mortalität beträgt 37,5% (Metzler 35,64%, Winckel 58,5%, Toth 50%, Heinsius 50%), und zwar wurden 2 Kinder tot extrahiert, 1 starb nach 10 Minuten Atmung. 1 Kind war faultot, es wird nicht mitberechnet.

(Bei Mitberechnung hätte ich 44,4% Mortalität.) Bei den 2 toten Kindern mußte der nachfolgende Kopf perforiert werden. Von den Müttern starb keine.

Über Störungen des Wochenbettes kann ich nichts wesentliches berichten, da nur 1 Geburt klinisch beobachtet wurde. Bei dieser war das Wochenbett ungestört.

Perforation.

Unter diesen Abschnitt fallen, wie schon eingangs erwähnt, nur die Fälle, bei denen der vorangehende Kopf perforiert und eventuell mit dem Cranioclasten extrahiert wurde.

Sie wurde ausgeführt in 13 Fällen = 6,16% der beobachteten engen Beckenfälle (Metzler 4,57%, Glöckner 6,7%, Scheffzek 3,9%, Peham 6,32%). Von diesen sind 7 Erst- und 6 Mehrgebärende.

Die Indikationen waren, abgesehen davon, daß alle Kinder bei Vornahme der Perforation schon tot waren: Gesichtslage und Febris intra partum 1 mal, Kontraktionsring und Fieber 2 mal, Kontraktionsring allein 1 mal, Stirnlage 1 mal, verschleppte Querlage 1 mal, Fieber 1 mal. In 6 Fällen machte der Tod der Kinder zusammen mit Stillstand der Geburt die Perforation notwendig.

Nabelschnurvorfall hatte den vorzeitigen Tod der Kinder in 6 Fällen verursacht, die alle poliklinisch beobachtet wurden. In einem Falle wurde die Rhachiotomie nach Küstner mit gutem Erfolge für die Mutter ausgeführt.

Die Mütter wurden 1 mal durch Dammriß II. Grades, 1 mal durch Cervixriß, 1 mal durch Cervix- und Dammriß II. Grades verletzt.

Gestorben ist keine Mutter, während Metzler eine Mortalität von 6,67%, Scheffzek von 4,4%, Kohn von 2,5% angeben.

Das Durchschnittsgewicht der Kinder ohne Hirn und Blut betrug 2921 g. Ich hebe nochmals hervor, daß kein Kind lebend perforiert wurde.

Wochenbetten waren sämtlich gestört, davon hatte eine Mutter Sepsis (Fall 183). Sie bekam schon 2 Stunden post partum einen Schüttelfrost und 41,1° Temperatur, die

3 Tage lang anhielt. Im Lochialsekret wurden Strepto- und Staphylokokken gefunden.

Sectio caesarea.

In 37 Fällen wurde Kaiserschnitt gemacht, d. h. in 17,5%, es ist also eine wesentliche Vermehrung der Sectio festzustellen; denn Kohn hat nur 11,4%, Heinsius 5,75%. Bei Scheffzek berechne ich nur 2,4%, doch stammt das Material seiner Arbeit aus einer Zeit, in der die Sectio cervicalis noch nicht allgemein gemacht wurde. Hannes erklärt die schon damals relativ hohe Prozentzahl der Kaiserschnitte bei Kohn einerseits durch die Ausschaltung der engen Becken über 9,5 c. v., andererseits dadurch, daß die Breslauer Klinik sich auf Grund der guten Resultate in manchem Falle leichter dazu entschlossen hat, Kaiserschnitt zu machen, als früher. Zum Teil trifft diese Erklärung auch hier zu. Die Fälle verteilen sich auf 13 Erst- und 24 Mehrgebärende = 35,1% : 64,9% (Kohn 27,6% : 72,4% oder 10 : 27, Scheffzek 8 : 9).

1 Mutter ging an akutester Sepsis zugrunde, es entspricht dies einer Mortalität von 2,7%.

Von den Kindern wurde 1 schwer asphyktisch geboren, nicht wiederbelebt, 1 starb 1 Tag alt (Partus praematurus mens IX. spontan), also ist die kindliche Mortalität = 5,4%. Rechne ich das infolge der Frühgeburt (also ohne Schuld der Beckenverengung) gestorbene Kind nicht mit, so beträgt sie nur 2,7%.

Ich bespreche nun die klassische und die zervikale Sectio caesarea gesondert.

a) Sectio caesarea classica.

Der klassische Kaiserschnitt wurde in 6 Fällen gemacht, d. h. in 2,8% aller Fälle von engem Becken. Er ist namentlich in den Jahren 1909/10 und 1910/11 fast gänzlich vom zervikalen Kaiserschnitt verdrängt worden. Stammen doch aus diesem Jahre nur 2 klassische Kaiserschnitte und bei diesen war vorher schon einmal Kaiserschnitt gemacht worden und außerdem wurde Sterilisation gewünscht und

bewilligt. Die 4 übrigen Fälle wurden in dem Jahre 1908/09 vorgenommen, also in der Zeit, in der sich die zervikale Sectio erst noch Bahn brechen mußte.

Die Sectio classica war allemal relativ indiziert. 2 Fälle wurden sterilisiert, der eine, nachdem schon 2 mal klassische Sectio an ihm ausgeführt worden war:

Die Hauptbedingungen für die Vornahme der Operation sind für Herrn Geheimrat Küstner dieselben geblieben: keine Untersuchung außerhalb der Klinik und keine solche mit nackten Fingern.

Das Resultat des klassischen Kaiserschnittes ist ein sehr gutes. Weder ein Exitus der Mutter noch der eines Kindes ist zu beklagen, alle Kinder sind lebensfähig geboren. Ihr Durchschnittsgewicht war 3018 g. Das schwerste wog 4060 g.

Kohn hat eine Mortalität der Mutter von $1-2,2\frac{0}{10}$, der Kinder von $2,8\frac{0}{10}$, Bürger eine solche von $2,5\frac{0}{10}$ resp. $1,7\frac{0}{10}$, Metzler $22,72\frac{0}{10}$ resp. $13,63\frac{0}{10}$, Scheffzek $16,6\frac{0}{10}$ resp. $0\frac{0}{10}$, Leopold $1,2\frac{0}{10}$ resp. $0\frac{0}{10}$.

Heinsius und Kretschmer haben eine kindliche Mortalität von $0\frac{0}{10}$, Kapischke eine solche von $9\frac{0}{10}$. Die Wochenbetten waren ungestört bis auf 1, bei dem die Temperaturerhöhung durch eine Bronchitis hervorgerufen wurde (1 mal über $38,0$).

b) Sectio cervicalis.

Sie wurde in 31 Fällen vorgenommen, d. h. in $14,6\frac{0}{10}$ der Gesamtfälle, und zwar transperitoneal 8 mal = $3,7\frac{0}{10}$ und extraperitoneal 23 mal = $10,9\frac{0}{10}$. 10 der Operierten waren Erstgebärende und 13 Mehrgebärende.

In 4 Fällen von transperitonealem Kaiserschnitt war es nicht gelungen, extraperitoneal zu bleiben: 1 mal lag die Plica so tief, daß sie nicht zu erreichen war, 1 mal läßt sich die Blase nicht abschieben. Die anderen Male war schon früher Sectio gemacht worden und der extraperitoneale scheiterte daran.

2 mal wurde die Sectio transperitoneal ausgeführt, weil gleichzeitig Sterilisation vorgenommen werden sollte, 1 mal, weil vorher ein im kleinen Becken befindlicher, vermeintlich

von den inneren Genitalien ausgehender Tumor entfernt werden sollte (s. Fall 134 in der Tabelle).

1 mütterlicher Todesfall fällt der transperitonealen Methode zur Last (Fall 135). Ich gebe einen Auszug aus der Geburtsgeschichte: 29. IV. 10. Da keine Dehnung der Cervix vorhanden ist, ist ein Abschieben der Blase unmöglich. Daher wird die transperitoneale Sectio vorgenommen. Anklemmen des Peritoneums, Inzision in die ca. $1\frac{1}{2}$ cm dicke Uteruswand, die sehr stark blutet. Zange ist leicht. — Mehrschichtige Naht. — 30. IV. 10. Sehr kleiner frequenter Puls, Abends Delirium, Wöchnerin ist sehr erregt, Temperatur 40,8. 1. V. 10. 2⁰⁰ a. m. Exitus letalis. — Im Blutausschrieb massenhaft Streptokokken. Obduktionsbefund: Därme stark gebläht, Oberfläche matt. Auf der Uterusserosa, besonders in der Gegend der Inzision fibrinöse Auflagerungen; kein Pus in der Bauchgegend, nur wenig trübes Exsudat. Viel Decidua im Uterus, aber von gutem Aussehen. Milz groß und weich. Sonst alles o. B. —

Der zervikale Kaiserschnitt wurde aus folgenden Indikationen vorgenommen: Kontraktionsring 10 mal, Dauerkontraktionen und schlechte Herztöne 3 mal, Tumor in pelvi parvo und enges Becken 1 mal, voraussichtliche Gebärmümmöglichkeit 11 mal, schlechte kindliche Herztöne 6 mal. Die Operation fand also statt aus Gründen von seiten der Mutter 10 mal = 32,3 %, aus Gründen von seiten der Kindes 6 mal = 19,3 %, aus Gründen von beiden Seiten 15 mal = 48,4 %.

Bei den zervikalen ging eine Mutter zugrunde, der oben näher beschriebene Fall. Es entspricht das einer Mortalität von 3,2 %. Bei der extraperitonealen Sectio ist keine Frau gestorben.

Kinder starben 2; 1 fällt der transperitonealen Sectio zur Last, doch ist es wohl nicht mitzuberechnen, weil es einer spontanen Frühgeburt im 9. Monat entstammte und 1 Tag alt an Lebensschwäche starb. Es hatte ein Gewicht von 2030 g. 1 Kind wurde beim extraperitonealen Kaiserschnitt tot extrahiert, nachdem es schon vor dem Operations-

beginn sich stark geschädigt gezeigt hatte. Es besteht also eine Mortalität von 6,4%, bei Abrechnung des einen Falles von 3,2%. Da der übrigbleibende 1 Fall dem extra-peritonealen Kaiserschnitt zugehört, so hätte dieser eine Mortalität von 4,3%.

Das Durchschnittsgewicht der Kinder betrug 3213 g, das größte wog 3740 g, das kleinste 2030 gr.

Die Wochenbetten waren in der Mehrzahl der Fälle gestört und zwar 20 mal = 64,5%. Außer der sekundären Wundinfektion war die Ursache der Störung 1 mal eine Mastitis, 1 mal ein Lungeninfarkt und Bauchdeckenblasenfistel, 2 mal Bronchitis, 1 mal Sepsis (Exitus), 1 mal Pneumonie, 1 mal Bronchitis und Cystitis, 1 mal Anämie. Die Mütter werden alle gesund und wohlauf entlassen, bis auf die an Sepsis gestorbene.

Die 2 nicht mit in diese Besprechung einbezogenen Zwillingsgeburten habe ich schon bei den Graden der Beckenverengung genauer beschrieben, in die sie hineingehören.

Es bleibt nun noch übrig, die Leistungen der einzelnen Entbindungsmodi zusammenzustellen und eine Betrachtung anzuknüpfen, welche von diesen, die schlechte Resultate liefern, durch eine bessere Methode ersetzt worden sind, resp. ersetzt werden können.

Die Resultate bei meiner Zusammenstellung sind folgende: Gesamtzahl der Geburten: 211 (darunter 2 Zwillingsgeburten).

	Anzahl in %	Mortalität	
		der Kinder in %	der Mutter in %
Spontan	37,32 %	3,94 %	0 %
Wendung	25,3 %	47,1 %	1,8 %
Extraktion	4,26 %	37,5 %	0 %
Zange	5,6 %	25 %	8,3 %
Hohe Zange	3,3 %	29,5 %	0 %
Perforation.	6,16 %	100 %	0 %
Klassischer Kaiserschnitt	2,8 %	0 %	0 %
Zervikaler Kaiserschnitt	3,7 %	3,2 %	3,2 %

Es haben also die besten Resultate für Mutter und Kind die klassische Sectio, dann die spontane Geburt, demnächst der zervikale Kaiserschnitt, die schlechtesten, natürlich außer der Perforation, die Wendung und die Extraktion. Auch die Resultate der Zange und der hohen Zange sind nicht erfreulich, wenn letztere auch, wie früher betont, besser sind, als vielfach angenommen wird.

Haben wir nun eine Möglichkeit, die Resultate der Perforation, der Wendung und der hohen Zange zu bessern und wodurch ist das möglich resp. ist eine Besserung schon aus der vorliegenden Arbeit ersichtlich? Ja, und zwar durch die Sectio cervicalis, d. h. diejenige Operation, auf die Hannes schon 1908, also zur Zeit des Aufkommens der Operation, große Hoffnungen für die Verbesserung der Resultate der Geburten bei engem Becken gesetzt hat.

Zunächst ist die Perforation auf einen Punkt zurückgedrängt worden, der jedem Geburtshelfer äußerst willkommen sein muß: es brauchten keine Perforationen am lebenden Kinde mehr vorgenommen zu werden, sie wurden, wie Herr Geheimrat Küstner schon 1909 mitgeteilt hat, nur am toten Kinde angewendet. Für den Arzt ohne Klinik bedeutet das wenigstens eine starke Einschränkung der Perforation am lebenden Kind auf Fälle, die er so stark verschleppt in seine Behandlung bekommt, daß an einen Transport der Frau nicht zu denken ist.

Der Einfluß der Sectio cervicalis auf die Resultate der Wendung durch Vermeidung der Perforation des nachfolgenden Kopfes tritt noch nicht zahlenmäßig so stark hervor, weil der größte Teil dieser Wendungen aus dem ersten Jahre der Zusammenstellung stammt, in welchem die Sectio cervicalis erst im Begriffe stand, sich Bahn zu brechen. Bei den Resultaten der hohen Zange glaube ich die günstigen Folgen des Dazwischentretens des zervikalen Kaiserschnittes schon sehen zu können. Jedenfalls finde ich in verschiedenen Geburtsgeschichten Bemerkungen, daß einerseits wegen der Gefahr, den nachfolgenden Kopf nicht durch das Becken bringen zu können, andererseits, weil der Versuch,

die hohe Zange auszuführen, scheiterte, zur zervikalen Sectio mit gutem Erfolge geschritten wurde.

Kohn hat noch 12 Perforationen am vorangehenden Kopf des lebenden Kindes zu verzeichnen. In seiner Arbeit ist auch die Perforation des nachfolgenden Kopfes häufiger angewendet als in meiner Zusammenstellung: In der Kohnschen mußte sie 11 mal von 322 Fällen = 3,4% gemacht werden, während sie in der vorliegenden nur in 2,8% der Fälle gemacht wurde.

Treten diese Wahrnehmungen auch noch nicht zahlenmäßig so deutlich hervor, so bin ich doch überzeugt, daß das in einer späteren Arbeit der Fall sein wird, weil meine Zusammenstellung sich eben noch aus der Übergangszeit zur zervikalen Sectio zusammensetzt.

Nun fangen sich schon an Stimmen zu regen, die gegen die Zurückdrängung der klassischen Sectio Protest erheben. die ihr alle Vorzüge vor der zervikalen Sectio zusprechen. So ist es besonders die Leopoldsche Klinik, die von den Vorzügen der Sectio cervicalis fast nichts übrig läßt. Leopold kommt zu dem Schlusse, daß „die klassische Sectio caesarea mit ihren sehr guten Resultaten für Mutter und Kind als die eleganteste Operation dominierend bleiben werde, welche von den Konkurrenzoperationen niemals weder eingeschränkt noch verdrängt werden wird“. Aus derselben Klinik stellt Richter dem extraperitonealen Kaiserschnitt folgendes Zeugnis aus: „Nach allem ist der extraperitoneale Cervixschnitt zwar eine wertvolle Bereicherung unserer geburtshilflichen Operationsmethoden, die uns in unserem Bestreben, die Perforation des lebenden Kindes nach Möglichkeit einzuschränken, schätzenswerte Dienste leisten kann, doch wird er nach meiner Meinung den klassischen Kaiserschnitt nie verdrängen können, da diesem der Vorteil der Einfachheit unbestritten anhaftet. Ich glaube deshalb auch, daß für die Klinik der klassische Kaiserschnitt die gegebene Operation bleiben soll und daß nur die Fälle, in denen uns der bisherige Geburtsverlauf keine Sicherheit für eine glatte Heilung verspricht, auch die Sectio cervicalis nach Latzko heran-

zuziehen ist. Doch ist usw. — Für schwer infizierte septische Fälle werden bei relativer Indikation die Perforation, bei absoluter der Porro die schonendsten Entbindungsarten bleiben.“ Leopold hat eine Mortalität von 7—8% bei den Müttern und eine solche von 8% bei den Kindern beim zervikalen Kaiserschnitt. Andere haben aber wesentlich bessere Resultate. Sie kommen bei anderen gleich nach der Sectio classica und halten sich ungefähr die Wage mit denen bei Spontangeburt. Die vorgenannten Autoren gehen gar nicht auf die Vorzüge der Sectio cervicalis ein, die mir doch recht gewichtig zu sein scheinen: der eine Vorzug liegt in der bedeutend größeren Indikationsbreite. Die Sectio cervicalis ist eben, wie schon oben ausgeführt, imstande, Operationsmethoden mit schlechten Resultaten zu verbessern, weil bei ihrer Anwendung die strenge Forderung: keine mehrfache innere Untersuchung und keine mit nackter Hand! — nicht so sehr berücksichtigt zu werden braucht, wie bei der klassischen Sectio. Der andere Hauptvorteil beruht auf der Verlegung der Narbe aus dem Corpus uteri in den Cervix. Und hierüber sind in letzter Zeit die Erfahrungen der meisten Kliniken übereinstimmend. Die Narbe des zervikalen Kaiserschnittes ist bedeutend wiederstandsfähiger als die des corporealen, wie die mehrfach beobachteten Fälle von erneuter Sectio ergeben haben.

Essind, wie Schick zusammengestellt hat, von Dahlmann 23 (7 nach Fundalschnitt), von Werth 12, von Singer 34 (10 nach Fundalschnitt), von Scheffzek 2 Fälle (1 nach Fundalschnitt) von Uterusruptur nach klassischem Kaiserschnitt publiziert worden. Die einzelnen Autoren benutzten allerdings zum Teil dieselben Fälle. Einen Fall, den ich mit beobachtet habe, veröffentlicht Schick dazu, eine Spontanruptur, die wahrscheinlich schon in der Gravidität entstanden ist, nach Fundalschnitt. Sie endete mit dem Tode der Frau. Eine weitere Beobachtung von Uterusruptur nach klassischem Kaiserschnitt finde ich auch unter den von mir zusammengestellten Geburten (Fall 193).

Von den Narben nach zervikalem Schnitt, die erneute Schwangerschaft resp. Wehentätigkeit auszuhalten hatten, rühmt dagegen Scheffzek an 10 selbst beobachteten Fällen die absolute Festigkeit der Cervixnarbe und erwähnt Olow, dem 30 Fälle mit derselben Beobachtung zur Verfügung stehen. Mayer sagt über seine 2 von ihm beobachteten Fälle: „Das wesentlichste an beiden Fällen ist das, daß die alte Narbe . . . nicht die geringsten Dehnungserscheinungen zeigte trotz der in beiden Fällen lange dauernden intensiven Wehentätigkeit.“ Rubeska erwähnt einen Fall von wiederholtem suprasymphysärem Kaiserschnitt: „Die Narbe in der Cervix war gar nicht sichtbar, war durch keine Verdünnung, durch keine Rinne angedeutet und nur an dem von der sero-serösen Naht herrührenden: . . . fortlaufenden Seidenfaden zu erkennen.“ Diese Erfahrungen lassen es also fast ausgeschlossen erscheinen, daß Rupturen der Narbe so häufig vorkommen wie beim klassischen Kaiserschnitt.

Weitere Nachteile der klassischen Sectio sind ferner die auch bei strengster Asepsis entstehenden größeren Adhäsionen der Därme untereinander und die des Uterus an der Bauchwand. Über den Zustand der Bauchhöhle nach zervikalem Kaiserschnitt sagt Mayer: „Betont muß werden, daß die Adhäsionen niemals Beschwerden gemacht haben und auf die Ausdehnung des Uterus in der Schwangerschaft und bei der Geburt keinen Einfluß haben. Im Gegensatz können die Verwachsungen des Uterus mit der Bauchwand nach alten Kaiserschnittsmethoden ungünstigere Verhältnisse schaffen als nach zervikalen Kaiserschnitten.“ Auch Küstner erklärt vom extraperitonealen Kaiserschnitt: „Es besteht zu Recht und zwar ebenfalls im Einklang mit Erfahrungen von Eröffnung der Bauchhöhle bei Frauen, bei denen früher ein extraperitonealer Kaiserschnitt gemacht worden war . . . : so einwandfrei und tadellos und frei von jeder Spur von Entzündung und Keimwirkung, wie nach extraperitonealem Kaiserschnitt, sieht man nach keiner Laparatomie die Bauchhöhle, am wenigsten nach intra- und transperitonealen

Kaiserschnitten.“ Auch Scheffzek macht auf diese Tatsache aufmerksam.

Gerade Küstner und Scheffzek sind es auch, denen die Erfolge besonders beim extraperitonealen Kaiserschnitt den Entschluß geben, ihre Indikationen für denselben wie folgt aufzustellen: Küstner: „In allen Fällen von räumlichem Mißverhältnis zwischen Kind und Becken, welches mit einiger Wahrscheinlichkeit die Geburt eines lebenden Kindes per vias naturales nicht zuläßt, wird der zervikale Kaiserschnitt gemacht.“ Er erklärt, daß er die Hebosteotomie und den Porro durch diese Operation ersetzen kann. Hannes begründet diesen Standpunkt Küstners in der oben schon mehrfach erwähnten Arbeit: Der Porro hat der Klinik schlechte Resultate geliefert, so daß er schon seit 1901 nicht mehr angewendet wird. Die Hebosteotomie sollte und ist wegen der starken Blutungen und der Gefahr der Weichteilverletzungen durch die Sectio caesarea ersetzt. Er fügt hinzu, daß die prophylaktische Operation der künstlichen Frühgeburt „mit allen ihr als solcher naturgemäß anhaftenden Schwächen und Fehlern nicht mehr nötig“ ist, da sie durch die Sectio ersetzt werden kann. Die künstliche Frühgeburt ganz aufzugeben, hält er nicht für berechtigt, da man für den Fall, daß eine Frau trotz dauernder Totgeburten die Sectio caesarea und eventuell die Hebosteotomie ablehnt, doch noch auf sie zurückgreifen müßte.

Scheffzek: „Die absolut einwandfreien Verhältnisse, wie sie nach der extraperitonealen suprapubischen Sectio sich herstellen und bei späterer Schwangerschaft und unter der Geburt erhalten bleiben, bestärken uns in dem Entschluß, dem suprapubischen Uterusschnitt auf Kosten des klassischen Kaiserschnittes immer größere Ausdehnung zu geben, ihn völlig an die Stelle der Pubotomie zu setzen, ja selbst die künstliche Frühgeburt, die uns sehr zufriedenstellende Resultate stets gegeben hat, zu seinen Gunsten etwas einzuschränken, besonders in Fällen, wo ein lebendes Kind mit Sicherheit erzielt werden soll.“

Beide Autoren wollen also zu Gunsten des extraperitonealen Kaiserschnittes Operationen über Bord werfen, die ihnen zwar auch gute Resultate gegeben haben, deren Resultate aber sich mit denen des extraperitonealen Kaiserschnittes nicht messen können. Und ihre Erfahrungen unterschreibt Yamasaki, wenn er sagt: „Wir haben bei unseren Erfahrungen von dem extraperitonealen Kaiserschnitt die Überzeugung gewonnen, daß diese Operation in der Behandlung der engen Becken eine weitgehende Anwendung verdient.“

Auf die Frage, ob die transperitoneale oder die extraperitoneale Sectio vorzuziehen ist, möchte ich nicht genauer eingehen, da Berufenere als ich im Begriffe stehen, diese Frage zu entscheiden. Ich möchte da auf die Abhandlung von Herrn Geheimrat Küstner im Zentralblatt für Gynäkologie 1911, No. 27 verweisen, in der dieser seine Stellung zu dieser Frage klar präzisiert. Herr Geheimrat Küstner tritt voll und ganz für den extraperitonealen Kaiserschnitt ein. Und ich glaube nach allen meinen Ausführungen, daß tatsächlich der extraperitoneale Kaiserschnitt geeignet und berufen ist, die Resultate der Geburten bei engen Becken wesentlich zu bessern.

Nachdem ich so meiner Aufgabe einigermaßen gerecht geworden zu sein hoffe, möchte ich zum Schlusse meinen hochverehrten früheren Lehrern, Herrn Geheimrat Dr. Küstner für die Anregung zu dieser Arbeit, die Überlassung des Materials und die Durchsicht, Herrn Professor Dr. Hannes für die Unterstützung bei der Arbeit und die Durchsicht derselben meinen ergebensten Dank aussprechen.

Literaturverzeichnis.

- Baisch, Indikationen und Technik der Wendung. Deutsche medizinische Wochenschrift. 36. Jahrgang. 1910. No. 51.
- Reformen in der Therapie des engen Beckens. Leipzig 1907.
- Bürger, Die Geburtsleitung bei engem Becken. Wien 1908.
- Glöckner, Beitrag zur Lehre vom engen Becken. III. Teil. Leipzig 1908.
- Hannes, Die Therapie bei engem Becken und ihre Wandlungen. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. Band 63. 1908.
- Heinsius, Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1894/95 bis 1896/97. Inaug.-Dissert. Breslau 1898.
- Kapischke, Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1900/01 bis 1902/03. Inaug.-Dissert. Breslau 1907.
- Kohn, Stefan, Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1903/04 bis 1907/08. Inaug.-Dissert. Breslau 1908.
- Kretschmer, Julian, Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1897/98 bis 1899/1900. Inaug.-Dissert. Breslau 1907.
- Küstner, Über den extraperitonealen Kaiserschnitt, seine Technik und Indikationsstellung. Münchener medizinische Wochenschrift. Jahrgang 1909. No. 34.
- Für den extraperitonealen Kaiserschnitt. Zentralblatt für Gynäkologie. 35. Jahrgang. 1911. No. 27.
- Leopold, Welche Stellung nimmt die klassische Sectio caesarea zur Hebesteotomie und zum extraperitonealen Kaiserschnitt ein? Archiv für Gynäkologie. 91. Band. 2. Heft. 1910.
- Mayer, Zur Kasuistik des wiederholten suprasymphysären Kaiserschnittes. Münchener medizinische Wochenschrift. 58. Jahrgang. No. 24. 1911.
- Metzler, Geburtsverlauf und Therapie beim engen Becken. 1891—1909. Archiv für Gynäkologie. 90. Band. 3. Heft. 1910.

- Peham, Das enge Becken. Wien und Leipzig 1908.
- Richter, Zur Kritik des zervikalen Kaiserschnittes. Archiv für Gynäkologie. 91. Band. 2. Heft. 1910.
- Rubeska, Wiederholter suprasymphysärer Kaiserschnitt. Zentralblatt für Gynäkologie. 34. Jahrgang. No. 35. 1910.
- Scheffzeck, Die Uterusnarbe des korporealen und zervikalen Kaiserschnittes und ihre Chancen bei späteren Schwangerschaften und Geburten. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. 67. Band.
- Rückblick und Ausblick in der Therapie des engen Beckens. Archiv für Gynäkologie. 88. Band. 1909.
- Wiederholter suprapubischer Kaiserschnitt an derselben Frau. Deutsche medizinische Wochenschrift. 35. Jahrgang. No. 32. 1909.
- Schick, Über einen Fall von Uterusruptur nach vorangegangenen klassischen Kaiserschnitt. Deutsche medizinische Wochenschrift. Jahrgang 1911. No. 37.
- Yamasaki, Über Geburten bei engem Becken. Archiv für Gynäkologie. 91. Band. 2. Heft. 1910.

Lebenslauf.

Ich, Karl Eduard Max Bleisch, bin geboren am 9. Juli 1883 zu Oppeln als der Sohn des damaligen praktischen Arztes, späteren Königl. Kreisphysikus zu Cosel O/S., Dr. Max Bleisch und seiner Frau Klara geborenen Stenzinger, bin Preuße, katholisch. Ich besuchte das Pro-Gymnasium in Cosel O/S. und das Königl. Gymnasium zu Strehlen in Schlesien. Am 19. September 1902 bestand ich die Reifeprüfung. Michaelis 1902 wurde ich bei der medizinischen Fakultät der Universität Breslau immatrikuliert und beendete am 24. November 1905 das Tentamen physicum, am 27. Februar 1908 das medizinische Staatsexamen vor der Prüfungskommission in Breslau.

Als Medizinal-Praktikant war ich am städtischen Krankenhause zu Ratibor und am St. Hedwigskrankenhause zu Warmbrunn i. R. beschäftigt. Nach erhaltener Approbation diente ich als einjährig-freiwilliger Arzt und Unterarzt d. R. Von November 1909 bis März 1911 war ich als Assistenzarzt am städtischen Krankenhause zu Gleiwitz tätig. Darauf hatte ich die II. Assistenzarztstelle an der Provinzial-Hebammenlehranstalt in Oppeln inne bis September 1911. Am 1. Oktober habe ich mich in Naumburg am Queis als praktischer Arzt niedergelassen.

Meine akademischen Lehrer waren:

Anschütz, Bonhoeffer, Brefeld, Czerny, Dienst, Filehne, Flügge, Garré, Groenouw, Hasse, Heine, Hinsberg, Hürthle, Krause, Kükenenthal, Küstner, Kültner, Ladenburg †, Lesser, Ludloff, O. E. Meyer †, Müller, Neißer, Peter, Ponfick, Röhmann, R. Stern †, von Strümpell, Uhthoff, Winkler, Zieler.

Allen meinen verehrten Lehrern sage ich an dieser Stelle meinen besten Dank.
